

1931  
Lane Medical Library

Aus dem Bakteriologischen Institut  
der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz in Bonn.  
Direktor: Dr. Eickmann.

---

# Beiträge zur Infektion der Hühner und Küken mit dem Erreger der weißen Kükenruhr (Bakterium pullorum)

---

## Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

veterinär-medicinischen Fakultät

der

Heffischen Ludwigs-Universität zu Gießen

vorgelegt von

Jan Janssen Steenblock

Tierarzt aus Dippum (Ostfr.)

Gedruckt mit Genehmigung der veterinär-medizinischen Fakultät  
der Universität Gießen.

Referent: Prof. Dr. Zwick.

Meinen lieben Eltern  
in Dankbarkeit gewidmet.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Kein Zweig der deutschen Landwirtschaft hat in den letzten zehn Jahren wohl so gewaltige Fortschritte gemacht wie die Geflügelzucht. Schon in den Jahren vor dem Kriege nahm die Zahl des Federviehs in unserem Lande immer mehr zu. In der Kriegszeit wurde sie aber wegen Fleischbedarfs und Futtermangels stark reduziert. Gleich nach den schweren Jahren setzte eine Steigung ein, sodaß im Jahre 1924 der Hühnerbestand wieder die Höhe von 1914 erreicht hatte und mit ungefähr 20% des Gesamtwertes des Viehbestandes den Wert der Schaf- und Ziegenzucht überflügelte (Wieman und Franke<sup>102</sup>). Von 1924 bis 1929 stieg dann die Zahl der Hühner von ca. 63<sup>1</sup>/<sub>2</sub> auf 83<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Millionen.

Einen nicht geringen Anteil an dem Aufblühen dieses Erwerbszweiges hat die Rheinprovinz, wo sich die Zahl der Hühner von ca. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Millionen im Jahre 1919 auf 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Millionen im Jahre 1929 empor schraubte, also eine Vermehrung um rund 200 % sich ergab. Geflügelfarmen schossen wie Pilze aus der Erde. Durch natürliche Brut konnte der Bedarf an jungen Hühnern bei weitem nicht gedeckt werden, deshalb wurde sie durch Brutmaschine und Kunstglücke ersetzt. Aufzucht und Haltung der Küken erfolgten unter Bedingungen, die denen der Natur oft stark widersprachen. Daß dadurch die Konstitution und Resistenz des einzelnen Tieres gegen Seuchen geschwächt wurde, liegt klar auf der Hand. Immer mehr Küken wurden auf einen engen Raum zusammengepfercht. Durch die so geschaffene enge gegenseitige Berührung wurde bei Ausbruch einer Seuche der Verbreitung großer Vorschub geleistet. Infektionskrankheiten, denen man vorher kaum Beachtung geschenkt hatte, hielten ihren Einzug in die Farmen und richteten ungeheuren Schaden an. Besonders eine Krankheit fordert heute mehr Opfer als alle andern zusammen genommen: Die Pullorum-Seuche, die vor dem Kriege in Deutschland unbekannt war und erst durch amerikanisches Zuchtmaterial eingeschleppt wurde.

## Verbreitung der Seuche.

Solange die Hühnerzucht nur als Nebenerwerb in der Landwirtschaft betrieben wurde, kannte man die Pullorumseuche nicht, erst die übertriebene Zucht auf Leistung öffnete der verheerenden Krankheit die Tür. In Amerika, der Wiege der intensiven Geflügelzucht, wurde die Seuche 1899 von Rettger<sup>81</sup> ermittelt. Von Amerika verbreitete sie sich über die ganze Welt. 1920 wurde die Kükenruhr von Leynen<sup>62</sup> in Belgien unter dem Namen des Ausgangsortes „La maladie de Sonderzeel“ beschrieben. Sie wurde dann festgestellt von de Blicq und van Heelsbergen<sup>38</sup> in Holland, Rice<sup>87</sup> in England, Riedmüller und Weidlich<sup>89</sup> in der Schweiz, Manninger<sup>68</sup> in Ungarn, Magnuffon<sup>64</sup> in den Nordischen Ländern. In Deutschland wurde sie zuerst von Beller<sup>7</sup> näher beschrieben. Bald wurde sie in allen Teilen Deutschlands als die größte Geißel der Hühnerzucht erkannt (Schmidt=Hoensdorf<sup>93</sup>, Beck und Eber<sup>5</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>, Wagener<sup>98</sup>, Lerche<sup>57</sup>).

## Erreger.

Bei einer Epidemie in Nordamerika, die bei 2–3 Wochen alten Küken auftrat, gelang es Rettger<sup>81</sup>, den Erreger zu züchten. Er gab ihm den Namen „Bakterium pullorum“. Schon von Rettger wurde es wegen seines morphologischen, kulturellen und agglutinatorischen Verhaltens in die Koli=Typhusgruppe eingereiht.

Es handelt sich bei dem Bakterium pullorum um ein 1–2 $\mu$  langes und 0,3–0,5 $\mu$  breites Stäbchen, dessen Enden etwas abgerundet sind; manchmal sind die Stäbchen so kurz, daß sie Kokken ähneln. Das Bakterium färbt sich gut mit den gebräuchlichen Anilinfarben, es ist gramnegativ und unbeweglich; einige Autoren (Beller<sup>8</sup>, Spiegl und Schmidt=Hoensdorf<sup>95</sup>, Gadeberg<sup>32</sup>) stellten allerdings eine geringe Eigenbewegung fest. Während Beller, Spiegl und Schmidt=Hoensdorf eine sichtbare Geißelung nachwiesen, gelang dies Gadeberg nach den Färbmethoden von Zettnow, Peppeler-Zettnow und

nach Löffler in keinem Fall. Das Wachstum des Erregers ist sehr verschieden. Manchmal wächst er auf Agar erst nach 48 Stunden zu hauchartigen, glänzenden, grauweißen Kolonien heran, während diese oft auch schon nach 24 Stunden einen Durchmesser von 1 mm besitzen; bei diesen großen Kolonien ist der Rand unregelmäßig gezeichnet. Ähnlich verhält sich das Wachstum auf der Drigalski- und Gaßnerplatte. Während Mießner und Berge<sup>73</sup> für die Züchtung der Blauplatte den Vorzug geben, wird im hiesigen Institut nur mit der Dreifarbenplatte nach Gaßner gearbeitet. Einzelne Stämme zeigen sowohl auf der Gaßner- wie auf der Drigalskiplatte konstant ein hauchartiges glasiges Wachstum ohne Farbumschlag des Nährbodens, andere wachsen schon nach 24 stündigem Brutschrankaufenthalt zu mittelgroßen Kolonien heran und zeigen auch deutlich den für den Paratyphuserreger charakteristischen Farbumschlag nach gelb auf der Gaßnerplatte. Gelatine wird nicht verflüssigt, in Bouillon ist schon nach mehreren Stunden ein Wachstum zu verzeichnen, was sich in einer gleichmäßigen Trübung der Fleischbrühe äußert. Nach 24 Stunden befindet sich am Boden ein feines, weißes Sediment, das sich beim Schütteln gleich wieder verteilt.

Das biochemische Verhalten ist auch sehr schwankend, wie von den verschiedenen Forschern festgestellt wurde (Goldberg<sup>34</sup>, Gage<sup>33</sup>, Manninger<sup>69</sup>, Doyle<sup>24</sup>, Beller<sup>8</sup>, Schmidt-Hoensdorf<sup>94</sup>, Beller und Latif<sup>12</sup>, Beck u. Eber<sup>5</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>, Greffel<sup>37</sup>, Altemeier<sup>1</sup>). Milhzucker wird in keinem Fall angegriffen, Traubenzucker wird von einigen Stämmen vergoren, von anderen dagegen nicht. Diese Erscheinung gab Veranlassung, zwischen einem Bakterium pullorum  $\alpha$  = gasbildend und Bakterium pullorum  $\beta$  = gaslos zu unterscheiden (Rettger<sup>92</sup>, Gage<sup>33</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>). Von letzteren wurden bei bis 6 Wochen alten Küken hauptsächlich gaslose Stämme gefunden, später hingegen mehr gasbildende, im hiesigen Institut wurden sowohl aus eingefandten Hühnern als auch aus Küken in überwiegender Mehrheit

gaslose Stämme gezüchtet. Von verschiedenen Autoren (Doyle<sup>24</sup>, Rice<sup>87</sup>, Beck und Eber<sup>5</sup>) wurden hinsichtlich des Verhaltens gegen Traubenzucker Schwankungen beobachtet. Bei künstlicher Fortzüchtung eines Stammes ging manchmal die gasbildende Fähigkeit verloren oder stellte sich plötzlich ein. Barfikow II = Milchezucker bleibt unverändert. In Barfikow I = Traubenzucker tritt gewöhnlich nach 24 Stunden Rötung, nach weiteren 24 Stunden milchige Trübung ein, die nach weiteren 1–3 Tagen in Gerinnung übergeht. Lackmusmolke wird gerötet, des öfteren vollzieht sich nach 2–5 Tagen wieder ein Farbumschlag in blau, Indol wird nie gebildet. Milch wird nicht zur Gerinnung gebracht, in Neutralrotagar hat man teils keine Veränderung, teils nur Fluoreszenz, teils Fluoreszenz und Gasbildung festgestellt. Saccharose bleibt unverändert, in Mannit wird immer Säure gebildet, in Maltose, Arabinose und Dulzit schwankt die Säure- und Gasbildung.

Auf Grund des biochemischen Verhaltens glaubte man anfangs eine sichere Trennung zwischen dem Bakterium pullorum und dem Erreger der typhoiden Erkrankung der Hühner (Bakterium typhi alcalifaciens Pfeiler, Bakterium sanguinarium Moore, Bakterium gallinarum Klein) machen zu können. Zunächst war es eine ganze Reihe künstlicher Nährböden, die diese Differenzierung zu ermöglichen schien, bei näherer Untersuchung erwiesen sich aber alle als untauglich. Greffell<sup>37</sup> hält zuletzt die Methylrotprobe nach Rettger und Koser<sup>86</sup> (Maltosebouillon) noch für ein sicheres Unterscheidungsmerkmal, indem er bei seinen Untersuchungen feststellte, daß das Bakterium pullorum Methylrot=negativ, das Paratyphusbakterium dagegen Methylrot=positiv war; aber schon bald nachher konnte auch diese Ansicht von Günther (nach Mießner und Berge<sup>73</sup>) widerlegt werden. So ist man jetzt auf dem Standpunkt angekommen, daß das Bakterium pullorum mit dem Bakterium paratyphus identisch ist (Schmidt-Hoensdorf<sup>94</sup>, Manninger<sup>69</sup>, Magnuffon<sup>64</sup>, Klimmer u. Haupt<sup>53</sup>, Lerche<sup>58</sup>, Wagener<sup>98</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>).

## Vorkommen.

Die durch das Bakterium pullorum hervorgerufene Krankheit ist unter dem Namen „Weiße Kükenruhr“, „bacillary white diarrhea“ jedem Geflügelzüchter bekannt. Da der kreideähnliche Durchfall nicht immer pathognostisch ist und manchmal fehlen kann, ist die Bezeichnung nicht einwandfrei, deshalb wurde auf der 2. Tagung der mit der Bekämpfung der Kükenruhr beschäftigten Institute von Nordamerika von Rettger der Name Pullorum-Seuche, „Pullorumdisease“ vorgeschlagen (Hinshaw und Mitarbeiter<sup>43</sup>). Auf dem Tierärztekongreß in London 1930 wurde dieser Gedanke wieder von Mießner vertreten.

### a) Infektionen bei Küken.

Der alte Name deutet darauf hin, daß die Seuche hauptsächlich bei Küken vorkommt. Von Lerche<sup>58</sup> und Eber<sup>26</sup> wurde das Bakterium pullorum als Todesursache bei Entenküken ermittelt, von Hewitt<sup>40</sup> auch bei jungen Puten. Die Mortalitätsziffer ist ganz verschieden. In einigen Beständen gehen 100<sup>0</sup>/o der Küken ein (van Heelsbergen<sup>38</sup>). Hinshaw und Sanders<sup>44</sup> ermittelten eine Sterblichkeit von 15—100<sup>0</sup>/o, Konno<sup>54</sup> von 45—100<sup>0</sup>/o. Lerche<sup>57</sup> berichtet über Verluste in verschiedenen Beständen, die zuweilen nur 8—10<sup>0</sup>/o, meist 14—30<sup>0</sup>/o, in einem Drittel der Erkrankung sogar 50—100<sup>0</sup>/o betragen. Das Bakterium pullorum braucht noch lange kein seuchenhaftes Auftreten zu bewirken (Spiegel und Schmidt-Hoensdorf<sup>95</sup>, Wagener<sup>99</sup>, Lüttichwager<sup>63</sup>, Hinshaw und Sanders<sup>44</sup>), prädisponierende Momente müssen erst den Organismus empfänglich machen. Erkältung, Überhitzung der Brutapparate, fehlerhafte Fütterung, feuchte Bodenverhältnisse, lange Transporte zählen zu solchen auslösenden Momenten. Da durch die natürliche Brut und Aufzucht bei der Gluckhenne diese Momente durchweg in Fortfall kommen, ist es leicht erklärlich, daß die Todesfälle dann viel geringer werden oder überhaupt nicht in Erscheinung treten (Doyle<sup>24</sup>, Lüttichwager<sup>63</sup>, Beller<sup>11</sup>). Brown (nach Beller) ließ vom Jahre 1912 ab

die Produkte von anfänglich 600 Eiern mehrere Jahre zur Hälfte im Thermostaten und zur anderen Hälfte von Hennen bebrüten. Von den Bruthennenküken fielen der Pullorumseuche im ersten Jahr 25<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, im zweiten Jahr 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub> und späterhin überhaupt keine Küken mehr zum Opfer; der Prozentlaß eingegangener Brutofenküken betrug demgegenüber im ersten Jahre 23,75<sup>0</sup>/<sub>0</sub> und erreichte im 6. Jahre sogar 69,48<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Das Alter der Küken spielt gleichfalls eine große Rolle im Bezug auf ihre Widerstandsfähigkeit. Die meisten Verluste fand Michels<sup>70</sup> bei 1—2 Wochen alten Küken, bei höherem Alter ging die Sterblichkeitsziffer wieder zurück. Andere Forscher (Doyle<sup>24</sup>, Schmidt-Hoensdorf<sup>93</sup>) beobachteten die meisten Todesfälle im Alter von 3—5 Tagen.

Wenn auch das klinische Bild eine sichere Diagnose nicht zuläßt, kann man doch aus den Erscheinungen am lebenden Tier wichtige Schlüsse ziehen. Die gewohnte Lebhaftigkeit fehlt bei den infizierten Tierchen, sie sondern sich ab und suchen warme Plätze auf, das Gefieder wird aufgeplustert, die Flügel hängen schlaff am Körper herunter, der Kopf wird eingezogen, die Augen sind geschlossen. Teilnahmslos stehen die Tiere da, indem sie sich gegenseitig stützen oder an Gegenständen anlehnen, sie geben wispernde, pieplende Töne von sich, der Durst ist vermehrt, in den meisten Fällen stellt sich bald ein weißlicher Durchfall ein. Durch die weichen Kotmassen werden die Haare am After verklebt, vor Schwäche fallen die Küken bald um und liegen apathisch auf einer Seite, der Tod tritt meist nach 1—2 Tagen ein.

Der pathologisch-anatomische Befund zeigt auch kein einheitliches Bild. Besonders bei akutem Krankheitsverlauf fehlt nicht selten jegliche krankhafte Organveränderung. Doyle<sup>24</sup>, Spiegl und Schmidt-Hoensdorf<sup>95</sup>, Beller und Latif<sup>12</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>, Wagener<sup>98</sup> fanden bei der akuten Form oft Schwellung der Leber und Milz mit nekrotischen Herden, ockergelbe Verfärbung der Leber, Blutreichthum der Lungen, Darmentzündung und Persistieren des Dotterlacks. Während

der Nahrungsdotter normaliter 1—2 Tage nach dem Schlüpfen aufgebraucht ist, erscheint er bei kranken Tieren noch bis zum 6. Tage in Walnußgröße, der Inhalt zeigt wässerige, gallertige, käfige oder feste Konsistenz, die Farbe schwankt zwischen hellgelb und schmutziggrün. Diese Erscheinungen halten Bunyea und Hall<sup>16</sup> aber nicht sehr charakteristisch für das Bakterium pullorum. Bei der chronischen Form, bei der der Tod erst nach einigen Wochen eintritt, findet man oft nekrotische Herde in den Lungen und im Epikard (Hinshaw und Mitarbeiter<sup>44, 45</sup> Niemann<sup>76</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>, Michels<sup>70</sup>). Außerdem fallen die Blinddärme durch ihr pralles wurfförmiges Aussehen auf. Das pathologisch-anatomische Bild ist so unbestimmt, daß nur die bakteriologische Untersuchung die Diagnose sichern kann. Lüttichwager<sup>63</sup> vertritt allerdings die Ansicht, daß auf Grund der klinischen Symptome und des Krankheitsverlaufes die Diagnose „Pullorumeuse“ manchmal gestellt werden muß, weil es ihm trotz hoher Wahrscheinlichkeit bei einem Teil von eingefandten Tieren aus verseuchten Beständen oft nicht gelang, den Erreger kulturell nachzuweisen. Im Gegensatz hierzu gelang es Michels<sup>70</sup> immer, das Bakterium zu züchten, er fand es in Ausstrichen von fast allen Organen. Nach seinen Angaben eigneten sich am besten das Herzblut sowie der Inhalt aus dem zurückgebliebenen Dotterlack zur Züchtung. Im hiesigen Institut wurde die Erfahrung gemacht, daß der Erreger außer aus dem Dotterlack auch sehr bequem aus der Leber isoliert werden kann, aus dem Herzblut dagegen nicht in allen Fällen.

## b) Infektionen bei Hühnern.

Das Bakterium pullorum kommt aber nicht nur bei Küken, sondern auch bei erwachsenen Hühnern vor, jedoch sind hier Todesfälle sowie epidemischer Verlauf der Krankheit selten, dagegen sind recht oft Tiere latent infiziert und nur durch die serologische Untersuchung (Agglutination) als infiziert herauszufinden. Die latent kranken Tiere sind äußerlich nicht von gefunden zu er-

kennen. Im ersten Jahre stehen die Legeleistungen der infizierten Tiere denen der gefunden nicht nach. Von den Züchtern wird immer wieder darüber geklagt, daß gerade ihre besten Legerinnen durch die Agglutination als Bakterienträger ermittelt werden. Der Grund liegt darin, daß die Tiere durch die gesteigerte Inanspruchnahme des Legeapparates in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen den Erreger geschwächt werden (Mießner und Berge<sup>73</sup>). Mit der Zeit läßt dann aber die Legetätigkeit nach und sistiert zuletzt vollkommen (Rice<sup>87</sup>, Owen<sup>80</sup>, Lüttichwager<sup>63</sup>). Besonders letzterer sieht in dem Nachlassen der Legeleistung eine Möglichkeit, die kranken Hühner zu erkennen und auszumerzen. Es muß aber betont werden, daß solche Tiere schon vorher durch infizierte Eier der Zucht großen Schaden zufügen können. Durch besondere Umstände kann die latente Form der Krankheit akut werden und den Tod herbeiführen. So berichtet Schmidt-Hoensdorf<sup>92</sup>, daß in einer Rhodelander-Herde 50<sup>0</sup>/<sub>0</sub> der Tiere der Seuche zum Opfer fielen. Am meisten gehen aber die Tiere an Sekundärfolgen der Infektion zu Grunde, z. B. Leberruptur mit nachfolgender Verblutung, Eileiterentzündung, Bauchfellentzündung, Herzbeutelentzündung.

Der Sektionsbefund bei chronisch erkrankten Hennen ist sehr verschieden, in den weitaus meisten Fällen ist der Eierstock charakteristisch verändert (Retzger<sup>82</sup>, Beller<sup>8</sup>, Schmidt-Hoensdorf<sup>94</sup>). Während man bei gefunden Hühnern goldgelbe, runde Dotterfollikel in den verschiedenen Entwicklungsstadien am Eierstock vorfindet, beobachtet man an den kranken Ovarien mehr oder weniger deformierte Dotter, diese haben ihre runde Form verloren, sind winkelig und hängen an kurzen oder langen Stielen. Die Wandung ist oft eigenartig schwartig verdickt, die Farbe ist graugelb, graugrün bis dunkelblauschwarz. Der Inhalt ist je nach Fortschritt der Schrumpfung dickflüssig, teigig bis fest. Im Anfangsstadium einer Infektion fanden Mießner und Berge<sup>73</sup> außerdem oft Dotterblasen von dunkelroter Farbe, deren Inhalt aus Blutwasser bestand.

Leber und Milz sind oft geschwollen und mit nekrotischen Herden durchsetzt, die Konsistenz ist brüchig, daher findet man häufig als Todesursache innere Verblutung infolge Leberruptur. Die Leber zeigt manchmal neben Schwellung nur eine ausgesprochene Broncefärbung. Durch Platzen von erkrankten Dotterfollikeln kommt es zu einer exsudativen Bauchfellentzündung; die zuerst wässerigen Exsudatmassen werden beim Abklingen der Entzündung zu Fibrinklumpen eingedickt, die das charakteristische Aussehen des Eigelbs haben. Die verklebten und verwachsenen Darmschlingen sind in diese geronnenen Massen hineinmodelliert (Bunyea<sup>15</sup>), manchmal zeigt auch nur das Peritoneum eine schmutzig-graue Verfärbung, mit kleinsten Blutungen durchsetzt, und schwartige Verdickung. Der Eileiter ist auch öfter verändert, man findet die geschwollene graurote Schleimhaut mit einem schmierigen Exsudat bedeckt. In den Lungen findet man des öfteren bis erbsengroße nekrotische Herde. Charakteristische Veränderungen weist häufig das Herz auf, sodaß man wohl von einem „typischen Pullorumherz“ reden kann, der Herzbeutel ist verdickt und oft prall mit serösem, fibrinösem oder sogar eitrigem Exsudat angefüllt, stellenweise ist er mit dem Myokard verwachsen. Die Herzmuskulatur ist mehr oder weniger stark degeneriert, man findet in ihr, besonders an der Herzspitze, grauweiße Herde. Durch diese Veränderung bekommt das Herz manchmal eine sehr plumpe Form.

Das Bakterium=pullorum ist am häufigsten aus den veränderten Dotterfollikeln zu züchten (Doyle<sup>24</sup>, Konno<sup>54</sup>, Bunyea<sup>15</sup>, Beller und Latif<sup>12</sup>, van Heelsbergen<sup>38</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>), aber es gelingt lange nicht immer, aus allen kranken Dotterblafen den Erreger zu isolieren. Darin ist wohl oft der Grund zu suchen, daß trotz typischer Veränderungen an den inneren Organen der Erreger nicht nachgewiesen werden kann. Es empfiehlt sich deshalb, aus möglichst vielen Dottern (6—8) anzulegen. Bunyea<sup>15</sup>, will den Erreger auch regelmäßig im Herzblut und in den Körperparenchymen nachgewiesen haben, was anderen Forschern nur in den wenigsten Fällen gelang.

(Mießner und Berge<sup>73</sup>, Beller und Latif<sup>12</sup>, Schmidt-Hoensdorf<sup>93</sup>). Das Bakterium wurde auch noch aus der Leber, der Milz, der Gallenblase, dem Herzbeutel, den Nieren und den veränderten Lungen gezüchtet. Die Züchtung des Bakteriums pullorum aus der Galle, den Nieren (Konno<sup>54</sup>), aus der Kloake (Hof<sup>47</sup>) und dem Eileiter (Hof<sup>47</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>) berechtigt zu dem Schluß, daß der Erreger mit den Abgängen ausgeschieden werden kann. Bei 13 Hähnen wurde von Doyle<sup>25</sup> sechsmal der Erreger aus dem Hoden isoliert, was Leynen<sup>62</sup> bei 20 positiv reagierenden Hähnen u. auch anderen (Brunett<sup>14</sup>) nicht gelang. Das Untersuchungsergebnis von Doyle läßt also die Möglichkeit zu, daß der Hahn mit den Spermien den Erreger auf Hühner übertragen kann.

### Infektionswege.

Die Frage der Ansteckung hat immer großes Interesse bei den Forschern geweckt, denn die Kenntnis der Infektionswege bildet die Grundlage erfolgreicher Bekämpfungsmaßnahmen.

Schon Rettger<sup>82</sup> stellte Übertragungsversuche an und konnte nach kurzer Zeit die Seuche experimentell erzeugen. Rettger und Stoneburn<sup>85</sup> stellten die für die Bekämpfung so wichtige Tatsache fest, daß Küken, die die Krankheit überstehen, Bakterienträger bleiben und dann als Zuchthennen mit dem Ei schon die Krankheit auf den jungen Embryo übertragen können. Viele infizierte Embryonen sterben schon im Ei ab, was natürlich ein sehr schlechtes Schlupfergebnis zur Folge hat. Bei systematischer Untersuchung ausgefrierter Eier konnte das Bakterium isoliert werden, allerdings konnte nur ein geringer Prozentsatz des schlechten Schlupfergebnisses auf Pulloruminfektion zurückgeführt werden (Doyle<sup>21</sup> 2,6%, Mießner und Berge<sup>73</sup> 2,8%, Altemeier<sup>1</sup> 15,44%). Lerche<sup>58</sup> untersuchte Eier von sieben Farmen, von denen drei verseucht waren, er fand in der ersten Farm 18–81%, in der zweiten 35% und in der dritten 9–12% der ausgefrieren und nicht geschlüpften Bruteier mit dem Erreger

infiziert. Beaudette und Mitarbeiter<sup>4</sup> geben auf Grund ihrer Versuche an, daß das Bakterium pullorum gar keinen Einfluß auf die Entwicklungsfähigkeit der Embryonen besitzt, Hinshaw und Mitarbeiter<sup>45</sup> kamen bei ihren Brutversuchen zu ähnlichen Ergebnissen, auch Beller u. Latif<sup>12</sup> u. Beach<sup>2</sup> konnten feststellen, daß die Anwesenheit des Erregers keinen entwicklungshemmenden Einfluß auf die Eier ausübt, nach ihrer Ansicht sind die Hauptursachen der Brutstörungen auf physikalische Einflüsse (zu starke Erhitzung, Mangel an frischer Luft, Feuchtigkeit und Bewegung) zurückzuführen. Lüttichwager<sup>63</sup> konnte durch natürliche Brutversuche die Meinung bestätigen, indem er unter der Henne Eier von positiv reagierenden Tieren mit sehr gutem Ergebnis ausbrüten ließ.

Ein Teil der infizierten Küken, soweit sie nicht schon im Ei absterben, kommt lebensschwach und krank zur Welt. Diese Tierchen bilden nun durch ihre Abgänge die geeignetste Infektionsquelle für die gesunden Insassen des gleichen Brutapparates, die durch Bepicken, enge Berührung oder auch durch Inhalation der bakteriengeschwängerten Luft (Hinshaw u. Mitarbeiter<sup>46</sup>) den Erreger aufnehmen. So treten im Laufe der ersten Tage schon ungeheure Verluste ein, die so stark werden können, daß manche Farmbetriebe das Brutgeschäft einstellen müssen (Schmidt-Hoensdorf<sup>93</sup>). Die Hauptgefahr kommt also von den erwachsenen Hühnern her, die den Erreger mit dem Ei auf die Küken übertragen. Eine spätere Infektion durch verfeuchten Boden oder Abgänge von alten kranken Hühnern scheint eine untergeordnete Rolle zu spielen (Mathews<sup>66</sup>), besonders bei solchen Küken, die infolge ihrer gesunden Abstammung im Vollbesitz ihrer konstitutionellen Abwehrkräfte sind. Dieser Standpunkt wird besonders von Lüttichwager<sup>63</sup> vertreten, der in dieser Hinsicht umfangreiche Untersuchungen anstellte, während andere Forscher (Mießner u. Berge<sup>73</sup>, Konno<sup>54</sup>) gegenteiliger Ansicht sind. Eine Übertragung von Huhn zu Huhn scheint sehr gering zu sein, wenn auch hier die Ergebnisse der Untersuchungen divergieren. Es ist er-

wiesen, daß das Bakterium pullorum mit den Abgängen ausgeschieden werden kann (Konno<sup>54</sup>, Hof<sup>47</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>), allerdings fand Hof bei seinen Untersuchungen an 400 positiv reagierenden Hennen nur bei 2% in der Kloake und bei 1,25% im Eileiter den Erreger. Spiegl und Schmidt-Hoensdorf<sup>95</sup> sind der Meinung, daß auch alte Tiere sich infizieren können, diese Ansicht wird durch die Untersuchungen von Edwards und Hull<sup>27</sup> insofern bestätigt, als sie nach Zusammenbringen von 73 positiv reagierenden Hennen zu 15 negativen nach mehreren Monaten bei fünf von letzteren eine positive Blutreaktion nachwiesen und auch den Erreger züchten konnten. Mathews<sup>66</sup> gelang es dagegen im Versuch nicht, durch Kot von Bakterienträgern die Krankheit auf andere Tiere zu übertragen. In einem Bestande, wo der Prozentlaß der positiv reagierenden Tiere trotz Ausmerzungen von 5 auf 80 stieg, war diese Verleuchung auf das Verfüttern von unbefruchteten Eiern zurückzuführen. Diese Art der Übertragung wurde von ihm experimentell nachgewiesen, indem er drei infizierte Eier an acht junge gesunde Hühner verfütterte; nach zwei Wochen reagierten alle positiv, nach der Tötung zeigten sechs pathologisch veränderte Eierstöcke, aus denen das Bakterium gezüchtet werden konnte. Auch Doyle<sup>24</sup>, Dalling u. Mitarbeiter<sup>22</sup> halten die Übertragungsgefahr bei erwachsenen Hühnern nur für gering. Eine eigenartige Beobachtung machte Brunett<sup>14</sup> bei seinen Übertragungsversuchen. Er hielt 17 Tiere mit negativen und 20 mit positiven Agglutinationsproben sieben Monate lang zusammen, ohne daß eine Übertragung durch die serologische Untersuchung nachgewiesen werden konnte. Nach Hinzufügen von drei erwachsenen, negativ reagierenden Hähnen konnte er dann bald bei der Hälfte der negativen Hennen eine Infektion des Eierstockes ermitteln. Er spricht dem Hahn bei der Übertragung insofern eine Bedeutung zu, als durch die enge körperliche Berührung bei dem Tretakt das Bakterium von der kranken Henne auf die gesunde übertragen wird. Dem Hahn kommt also nach Brunetts

Ansicht eine vermittelnde Rolle zu. Diese Ansicht vertreten auch Rice<sup>87</sup>, Mießner u. Berge<sup>73</sup>, Rohonyi<sup>90</sup>. Beller und Latif<sup>12</sup> beobachteten dagegen in keinem Fall eine spontane Übertragung, weder durch Zusammenleben noch durch den Tretakt.

### **Bekämpfung.**

Bei der Bekämpfung der Pullorumseuche spielen zwei Punkte eine Hauptrolle: Hygiene bei Brut und Aufzucht und Zuchtwahl. Bei der natürlichen Brut sorgt die Glucke durch ihre Eigenwärme für die geeignetste Bruttemperatur, die Eier werden oft mit den Füßen und Flügeln in eine andere Lage gebracht und frische Luft hat genügend Zutritt. Alle diese Aufgaben müssen auch bei der Brutmaschine erfüllt werden. Daß diese Bedingungen zum Teil nur mangelhaft erfüllt werden können, liegt klar auf der Hand. Viele Autoren (Beller<sup>7</sup>, Bushnell und Brandy<sup>18</sup>, Hinshaw und Mitarbeiter<sup>46</sup>, Mießner<sup>71</sup>, Coon<sup>19</sup>) heben die technischen Fehler der künstlichen Bebrütung hervor und geben Mittel und Wege an, wie man den Übelständen abhelfen kann. Die Temperatur muß streng überwacht werden, besonders in den letzten Tagen vor dem Schlüpfen. Zu hohe Brutwärme wirkt äußerst schädigend auf die Lebensfähigkeit der jungen Küken, sodaß diese oft nicht im Stande sind, die Eischale zu durchbrechen und dann ersticken. Die durch die Atmung im Ei entstehende kohlen säurehaltige Luft muß regelmäßig und oft durch sauerstoffreiche ersetzt werden, was durch Ventilation besorgt wird. Durch diese künstliche Luftbewegung werden nun aber beim Schlüpfen die Erreger, die am Flaumkleid der auskriechenden Küken haften, beim Trocknen durch den ganzen Raum gewirbelt und dringen durch die Nase in den Organismus ein, es entsteht die sogenannte Kunstbrutpneumonie (Hinshaw und Mitarbeiter<sup>46</sup>). Eine häufige Desinfektion des Brutapparates während der Brutperiode ist deshalb angebracht, von Coon<sup>19</sup> wird dazu Formaldehyd empfohlen. An den Schlupftagen wird der Brutapparat möglichst dunkel

gehalten, damit die schlüpfenden Küken sich ruhig verhalten und nur mit den benachbarten Tierchen in Berührung kommen. Da die Ansteckungsgefahr in den ersten drei bis vier Tagen sehr groß ist, empfehlen Mießner<sup>71</sup> und Lerche<sup>58</sup>, in diesen Tagen die Küken in möglichst kleiner Zahl in Drahtkäfigen getrennt zu halten. Dadurch hat man eine viel bessere Übersicht und kann die schwachen und kranken Tiere sofort ausmerzen, bevor sie schon den Erreger über den ganzen Bestand verbreitet haben. Nach vier Tagen kann man dann die Küken unter eine größere Schirmglucke bringen, doch ist es zu empfehlen, eine möglichst kleine Zahl (200) unter einer Glucke großzuziehen (Mießner<sup>72</sup>). Von Lüttichwager<sup>63</sup> wird weiter in Vorschlag gebracht, die Wärmequellen an mehreren Stellen anzubringen, dadurch wird vermieden, daß die Küken sich alle um ein Wärmezentrum konzentrieren, wodurch einmal auch wieder die Kontaktinfektionsgefahr verringert wird, zum anderen aber auch nicht so leicht Todesfälle durch gegenseitiges Erdrücken vorkommen. Auch die kohlen-säuregeschwängerte Atmungs-luft muß oft durch reine ersetzt werden. Daß unter der Schirmglucke die Temperatur sorgfältig überwacht werden muß, ist selbstverständlich. Den kleinen Küken muß vom ersten Tage an Gelegenheit geboten werden, sich an die Außentemperatur zu gewöhnen und sich abzuhärten. Der Raum, in dem die Kunstglucke aufgestellt ist, darf also nicht zu stark über die Außentemperatur erwärmt werden. Das entspricht ja auch den natürlichen Verhältnissen, denn bei der Gluckhenne sitzen die Küken auch nicht dauernd unter den erwärmenden Flügeln. Bei der Fütterung werden häufig Fehler gemacht, die zu einer weiteren Verbreitung der Seuche beitragen. In den ersten Tagen erhalten die Küken nur saure Milch, die Milchsäure wirkt durch ihre bakterizide Eigenschaft günstig auf die Darmflora ein, wie von Sokolowsky<sup>101</sup> festgestellt wurde, der Ha-Bu, halbfeste Buttermilch, als Hilfsmittel zur Bekämpfung der Kükenruhr empfiehlt. Ist die größte Infektionsgefahr vorbei, dann reicht man trockenes Mischfutter. Es ist immer zu em-

pfehlen, mit dem Trinkwasser ein Darmdesinfiziens zu verabfolgen (Chinofol, Kalium permanganat). Das Körnerfutter darf nicht in die Streu geschüttet werden, um eine Verunreinigung durch die Abgänge der Küken zu vermeiden, auch die Futter- und Wasserbehälter sind so anzubringen oder zu verdecken, daß eine Verunreinigung ausgeschlossen ist.

Die großartigsten hygienischen Maßnahmen können aber nur dann den gewünschten Erfolg versprechen, wenn die Individuen, bei denen sie angewandt werden, im Besitze ihrer vollen Abwehrkräfte sind. Die Resistenz gegen das Bakterium pullorum können wir hauptsächlich nur von solchen Küken erwarten, die von gesunden, kräftigen Eltern stammen. Die erste Aufgabe eines guten Züchters liegt darin, durch scharfe Beobachtung und Leistungskontrolle einen gesunden Zuchtschlag zu schaffen. Wie wir wissen, bilden die „Bakterienträger“ unter den Hühnern die Hauptansteckungsgefahr durch das Ei, solche Tiere dürfen also nicht zur Zucht verwandt werden. Da sich die infizierten Hennen weder durch ihr Äußeres noch durch ihre Legeleistung von gesunden unterscheiden, ist es Aufgabe des Tierarztes, diese Tiere ausfindig zu machen und von der Zucht auszuschließen. Es ist nicht erforderlich und wirtschaftlich untragbar, die kranken Tiere abzuschlachten; — ob überhaupt eine Trennung der positiven von den negativen Tieren erforderlich ist, bedarf noch weiterer Klärung. — Die guten Legerinnen werden im Gegefall untergebracht und zur Eierproduktion verwandt (Lüttichwager<sup>63</sup>), die Eier dürfen selbstverständlich nicht zu Brutzwecken benutzt werden.

Zur Diagnose der Bakterienträger wandte Jones<sup>49</sup> als erster im Jahre 1912 die Agglutination an. Tiere, die nämlich mit dem Bakterium pullorum infiziert werden, bilden im Blute Schutzkörper, sogenannte Agglutinine. Bei künstlicher Infektion fand Schmidt-Hoensdorf<sup>92</sup> bereits nach zehn Tagen bei allen Hühnern solche Antikörper im Blute. Setzt man nun zu einem Serum, in dem die Agglutinine enthalten sind, eine Aufschwemmung von

Pullorumbakterien, dann ballen sich diese zu sichtbaren Flöckchen zusammen. Ungefähr 2 ccm Blut wird durch Anrißen aus der Vena cutanea ulnaris (Bittner<sup>13</sup>), die medial über das Ellbogengelenk verläuft, entnommen und in einem Röhrchen aufgefangen. Mießner und Berge<sup>71</sup> empfehlen, mit glühendem Messer die Wunde zu brennen, was nach den Erfahrungen im hiesigen Institut nicht erforderlich ist. Durch das eine Minute lange Andrücken des Flügels an den Körper kommt die Blutung durchweg zum Stillstand. Nachdem jedes Röhrchen mit einer Nummer gekennzeichnet ist, werden sie an die Institute eingeliefert, dort wird das Serum nach der Serumlangsammethode auf den Agglutiningehalt untersucht. Zu diesem Zweck werden Serum und Testflüssigkeit in einem bestimmten Verhältnis in einem kleinen Agglutinationsröhrchen zusammengemischt, nach ca. 10 - 20 stündigem Brutschrankaufenthalt wird das Ergebnis entweder mit bloßem Auge, (an den Bakteriologischen Instituten der Landwirtschaftskammern<sup>105</sup>) oder mit dem Agglutinoskop (Mießner und Berge<sup>75</sup>) abgelesen. Zur Herstellung der Testflüssigkeit wird eine Abschwemmung frisch angelegter 24 stündiger Agar-schräggkulturen von Bakterienstämmen verwendet. Als Abschwemmungsflüssigkeit nehmen Mießner u. Berge<sup>75</sup> physiologische Kochsalzlösung. Um unspezifische Ausflockungen auszuschalten, wurde von Beller und Latif<sup>12</sup> eine 4% NaCl-Lösung gebraucht. Mathews<sup>66</sup> schlägt vor, zu 100 ccm Antigen 2 ccm einer 2% igen Lösung von NaOH zuzusetzen. Staffeth u. Thorp<sup>96</sup> u. Mallmann<sup>65</sup> bestätigen, daß diese Testflüssigkeit die klarste Reaktion ergibt, während bei Zusatz von Formalin die Reaktion undeutlicher ausfällt. Bei der Verwendung einer solchen Testflüssigkeit hält Mallmann es nicht mehr für nötig, die Tiere vor der Blutentnahme hungern zu lassen, was für die Legetätigkeit von großem Wert ist. Nach Fitch und Lubbehusen<sup>31</sup> sollen durch Phenolzusatz die unspezifischen Ausflockungen behoben werden. Nach einem Übereinkommen der Leiter der Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern wird in diesen Instituten zu

der physiologischen NaCl-Abschwemmung 0,1% Formalin (40% 0ig) zugelegt<sup>105</sup>. Dieser Zusatz hat sich nach Schmidt-Hoensdorf<sup>93</sup> als sehr brauchbar erwiesen.

Hinsichtlich des Titers, mit dem am besten die Bakterienträger ausfindig gemacht werden können, gehen die Ansichten der Autoren auseinander. Jones<sup>49</sup> stellte bei seinen ersten Versuchen fest, daß die Sera aller infizierten Tiere in einer Verdünnung von 1 : 100 das Antigen agglutinierten. Graham u. Tunnicliff<sup>35</sup> fanden, daß bei einer Serumverdünnung von 1 : 10 unspezifische Reaktionen auftreten und halten infolgedessen den Titer für zu niedrig. Dalling und Mitarbeiter<sup>22</sup>, Edwards u. Hull<sup>27</sup> betrachten den Titer 1 : 40 als positiv, während Hinshaw<sup>42</sup> für einen Titer von 1 : 50 eintritt. In England wird nach Doyle<sup>24</sup> die Agglutination bei einer Serumverdünnung von 1 : 25 als positiv angesprochen. Auf diesen Titer haben sich auch im letzten Sommer die Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern geeinigt<sup>105</sup>, während vorher nach einer Zusammenstellung von Lerche<sup>58</sup> fast jedes Institut eine besondere Titergrenze festgelegt hatte. Andere Autoren (Schmidt-Hoensdorf<sup>93</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup>, Beller und Latif<sup>12</sup>) halten den Titer 1 : 100 für am besten geeignet, weil bei einem niedrigeren Titer der Prozentsatz der Tiere, die trotz Reagierens keine pathologischen Veränderungen an den Organen zeigen, immer größer wird. Nach neueren Erfahrungen im hiesigen Institut liegt der Titer 1 : 25 zu niedrig, wir beobachteten bei dieser Serumverdünnung häufiger ein Wachstum von kokkenähnlichen Bakterien, die sich am Boden des Röhrchens niederlegten und eine Agglutination vortäuschten. Die Blutuntersuchung wird hauptsächlich nach der von Jones<sup>49</sup> eingeführten Serumlangsamethode durchgeführt. Bei dieser ist ein Zusammenarbeiten des blutentnehmenden Tierarztes mit einem Institut unumgänglich. Dabei stellen sich manchmal gewisse technische Schwierigkeiten ein, auf die in letzter Zeit Wagener<sup>100</sup>, Mießner und Berge<sup>74</sup> ausführlich hingewiesen haben.

Als erster versuchte deshalb Beaudette<sup>3</sup>, die Institute auszuschalten und die Bakterienträger durch eine vereinfachte Methode ausfindig zu machen. Er setzte zu einem Tropfen Serum eine bestimmte Menge Antigen hinzu und konnte schon nach einigen Minuten das Ergebnis ablesen. Allerdings konnte die Prüfung erst mehrere Stunden nach der Blutentnahme vorgenommen werden, weil das nötige Serum sich in dieser Zeit absetzen mußte. Dieses Verfahren wurde später von Runnels und seinen Mitarbeitern<sup>91</sup> weiter ausgebaut. Serum und Antigen werden in kleinen Vertiefungen, die sich in einer Glasplatte befinden, zusammengetan und mit einem Zahnstocher verrührt. Die Glasplatte ist auf einem Kasten befestigt, in dem sich eine licht- und wärme-spendende elektrische Lampe befindet. Bei Anwesenheit von spezifischen Agglutininen im Serum stellt sich innerhalb einiger Minuten eine Ausflockung ein; das Einsenden der Blutproben an die Institute fällt weg. Um unspezifische Ausflockungen zu vermeiden, wurde von Runnels eine 12<sup>0</sup> 0 ige NaCl-Lösung mit 0,5<sup>0</sup> 0 Phenol-zusatz zur Herstellung des Antigens verwandt. Diese Methode wurde von Stafseth und Thorp<sup>96</sup> und Beach<sup>2</sup> als sehr praktisch anerkannt und zur Untersuchung empfohlen. Ideal ist jedoch auch diese Methode nicht, weil zwischen der Blutentnahme und der Untersuchung noch einige Zeit vergeht, in der sich das Serum erst absetzen muß.

Schmidt-Hoensdorf<sup>93</sup> stellte als erster Versuche an, die Agglutinine im frischen Blute nachzuweisen, er mischte in einem Agglutinationsröhrchen das Blut mit der Testflüssigkeit. Er gab aber die Untersuchung bald auf, weil die sich niederschlagenden Blutkörperchen die Reaktion verdeckten. Diese technischen Schwierigkeiten wurden nun von Bunyea, Hall und Dorset<sup>17</sup> mit Erfolg überbrückt. Damit führten sie die Frischblut-schnellmethode in die Praxis ein, deren Brauchbarkeit von Edwards und Hull<sup>30</sup>, Wagener<sup>100</sup>, Mießner und Beige<sup>74</sup> und Steenblock<sup>97</sup> bestätigt wurde. Ein

Tropfen Blut, der durch Anrühren des Kammes oder Kehllappens gewonnen wird, wird mit Hilfe eines „Ausstreichers“ (Objektträger) auf einem Objektträger ausgestrichen. Nach Hinzufügen eines Tropfens Testflüssigkeit soll sich bei positiven Proben nach 5—30 Sekunden schon eine Ausflockung einstellen. Zur besseren Sichtbarmachung der Reaktion benützen die meisten der genannten Autoren den von Runnels bei der Serum Schnellmethode verwandten Kasten, während ich zu diesem Zweck einen besonderen Tisch konstruierte, bei dem die elektrische Lichtquelle durch das Tageslicht ersetzt wurde.

Anschließend sei auch noch auf die zur Ermittlung der infizierten Tiere von Ward und Gallagher (nach Wernery<sup>101</sup>) eingeführte intradermale Probe mit „Pullorin“ hingewiesen, die der Tuberkulinprobe beim Geflügel sehr ähnlich ist. Vergleichende Untersuchungen von Dalling und Mitarbeitern<sup>23</sup>, Edwards u. Hull<sup>27</sup>, Staffleth u. Thorp<sup>96</sup> ergaben, daß diese Methode der Agglutination nachsteht. Die Franzosen Lahaye<sup>56</sup>, Lesbaugries u. Mitarbeiter<sup>60</sup> berichten über gute Erfolge. Lahaye lehnt sogar die Agglutination ab, weil die Methode zu teuer, unsicher und mühsam sei, er tritt unbedingt für die Pullorinimpfung ein, ihre Ergebnisse seien ausreichend.

Die Einstellung von Lahaye bringt schon klar zum Ausdruck, daß die Agglutinationsprobe Mängel aufweist. Der Hauptmangel besteht ohne Frage darin, daß der Agglutiningehalt des Blutes sehr oft nicht mit den pathologisch-anatomischen Veränderungen oder mit dem bakteriologischen Befund übereinstimmt. Nur sehr wenige Forscher (Doyle<sup>24</sup>, Lewis<sup>61</sup>, Nystedt<sup>78</sup>) fanden eine gute Übereinstimmung zwischen der serologischen Untersuchung und dem Sektionsbefund, andere fanden nur in einem mehr oder weniger großen Prozentsatz die durch die serologische Untersuchung gestellte Diagnose durch die Sektion bestätigt (Bunyea<sup>15</sup>, Olney und Bederke<sup>79</sup>, Newsom u. Mitarbeiter<sup>75</sup>, Beller u. Latif<sup>12</sup>, Lerche<sup>58</sup>, Mießner u. Berge<sup>73</sup>, Kernkamp<sup>52</sup>, Lüttichwager<sup>63</sup>). Einerseits können Sera von infizierten Hühnern eine

negative Reaktion ergeben (Graham und Tunicliff<sup>55</sup>, Lerche<sup>58</sup>), darin liegt das größte Hindernis für die völlige Tilgung der Seuche in einem erkrankten Bestande, — andererseits wurde festgestellt, daß nicht alle positiv reagierenden Hennen Bakterienträger sind (Lüttichwager<sup>63</sup>). Verschiedene Autoren gelangten zu dem Ergebnis, daß der Agglutiningehalt des Serums großen Schwankungen unterworfen ist, dies wiesen Dalling und Mitarbeiter<sup>22</sup> durch umfangreiche Untersuchungen nach. Sie betonen, daß die Zahl der Agglutinine zeitweilig so gering werden kann, daß eine Agglutination bei der als positiv anzusprechenden Titergrenze nicht mehr auftritt, obwohl der Erreger im Eizstock nachgewiesen werden kann. Olney u. Bederke<sup>79</sup> berichten, daß von 112 bei der ersten Blutuntersuchung positiv reagierenden Tieren bei der zweiten Untersuchung nur noch 89 eine Agglutination zeigten. Bei der bakteriologischen Untersuchung konnte man jedoch aus 98 den Erreger züchten. Newsom und Mitarbeiter<sup>75</sup> prüften während zwei Jahren bei 37 Hühnern den Titer, 18 Tiere reagierten während der ganzen Untersuchungszeit positiv, 9 negativ und 10 zweifelhaft, d. h. das Serum dieser Tiere reagierte manchmal positiv, manchmal negativ. Bei der Schlachtung konnten sie bei 12 von den 18 positiven Tieren das Bakterium nachweisen, bei den 10 zweifelhaften 6 mal, dagegen fanden sie bei den 9 dauernd negativ reagierenden keinmal den Erreger. In der zweiten Serie wurden 59 Hühner 3 Jahre lang fortlaufend untersucht; von den 59 Tieren reagierten 25 positiv, 13 negativ, 21 zweifelhaft. Aus den 25 positiven Hühnern züchteten sie 22 mal das Bakterium pullorum, aus den 13 negativen wieder keinmal, bei den zweifelhaften war die bakteriologische Untersuchung auch teils positiv, teils negativ. Die Untersuchungen ergaben also, daß bei positiver Reaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Infektion vorliegt, daß aber bei negativer Reaktion Bakterienfreiheit nicht immer zutrifft.

Beller und Latif<sup>12</sup> unterzogen in 14 Monaten 10 positive Hühner sechsmal einer serologischen Untersuchung,

bei 6 Tieren ging der Titer unter 1 : 100 zurück, nur bei 2 Tieren konnten sie den Erreger bakteriologisch nachweisen. Sie sind mit Bederke<sup>6</sup> der Meinung, daß Hennen mit niedrigem Titer die Tendenz zum Ausheilen haben, während hoch agglutinierende Tiere dauernd positive Werte zeigen.

In einem gewissen Gegensatz zu den erwähnten Autoren steht das Ergebnis der von Edwards u. Hull<sup>27</sup> beschriebenen Untersuchungen. 93 positiv reagierende Hühner wurden monatlich während eines ganzen Jahres untersucht und überraschenderweise wurde festgestellt, daß bei den 984 vorgenommenen Agglutinationsproben nur sechsmal ein negatives Ergebnis vorkam. 5 der negativen Reaktionen fanden sich bei Hühnern, die von Anfang an schwach reagiert hatten. Bei 80 von 88 der Tiere wurde kulturell das Bakterium nachgewiesen.

Da die infizierten Hühner den Erreger durch das Ei auf die Küken übertragen, hat Lerche<sup>58</sup> das Blutuntersuchungsergebnis mit der bakteriologischen Untersuchung der Eier verglichen. Nach seinen Untersuchungen wurden zahlreiche mit dem Bakterium infizierte Eier auch von Hühnern mit niedrigem oder gar negativem Agglutinationstiter ermittelt, andererseits legten hoch agglutinierende Tiere keine infizierten Eier. Die Blutuntersuchung zeigt also nicht immer mit voller Sicherheit die Bakterienausscheider an, deshalb schlägt Lerche vor, auch noch die bakteriologische Eieruntersuchung mit zur Bekämpfung heranzuziehen, ein Gedanke, der praktisch wohl kaum durchführbar ist.

Trotz der geschilderten Mängel halten die meisten Forscher die Ausschaltung der bei der Agglutinationsprobe positiv reagierenden Hennen und Hähne von der Zucht für den Hauptfaktor im Kampfe gegen die Pullorumseuche, natürlich muß sie durch geeignete hygienische Maßnahmen unterstützt werden. Daß dann die Erfolge nicht ausbleiben, wird durch fortlaufende Untersuchungen vieler Forscher bewiesen. Es liegt natürlich klar auf der Hand, daß der Grad der Verseuchung eine Rolle spielt.

Nach Hinshaw's<sup>41</sup> Erfahrungen kann aber jede Herde, ob stark oder schwach verseucht, bei Berücksichtigung aller hygienischen Maßnahmen in einer einzigen Untersuchungsperiode seuchenfrei gemacht werden. Er berichtet, daß bei 22 Herden mit 165588 Hühnern bei der ersten Untersuchung schon 90<sup>0 0</sup> der Bakterienträger erfaßt wurden. In Virginia konnte bei systematischer Bekämpfung innerhalb 3 Jahren der Prozentsatz der infizierten Tiere von 15,2 auf 5,1 zurückgebracht werden (Wilson<sup>103</sup>). Graham und Tunnicliff<sup>35</sup> heben hervor, daß von 196 Besitzern, die die Bekämpfungsvorschriften genau befolgten, bei 187 die Kükenverluste bedeutend abnahmen. 146 von diesen hatten sogar überhaupt keine Abgänge mehr an Kükenruhr. Einen imponierenden Erfolg hatte auch Mießner in einem Bestande, der 3 Jahre lang unter seiner Kontrolle stand. In dieser Zeit gelang es ihm, die Zahl der positiv gefundenen Blutproben von 28<sup>0 0</sup> auf 1,3<sup>0 0</sup> herabzudrücken (Ministerialblatt der Preuß. Verw. f. Landw., Domänen und Forsten (1930), Jahrgang 26 No. 33.)

Es kann aber nicht genug hervorgehoben werden, daß die Bekämpfung mit der Agglutination durch hygienische Maßnahmen ergänzt werden muß, wenn man Erfolge erwartet (Beller und Latif<sup>12</sup>, Mießner<sup>71-72</sup>). Hinshaw<sup>41</sup> sieht den Hauptgrund von Mißerfolgen in der Bekämpfung der Seuche darin, daß die infizierten Herden nur einmal im Jahre untersucht werden. Leider ist es gerade in Deutschland sehr oft der Fall, daß Farmbesitzer nur der Reklame halber einmal im Jahre die Hühner untersuchen lassen. Damit ist aber der Sache durchaus nicht gedient. Je öfter die Blutuntersuchung durchgeführt wird, umso früher kommt man zum gewünschten Ziele; eine zweimalige serologische Untersuchung ist Mindestforderung.

Leider gibt es in Deutschland noch keine einheitlichen Richtlinien, auf deren Basis eine systematische Bekämpfung durchgeführt werden kann. In anderen Ländern hat man in dieser Hinsicht schon viel geleistet. In Pennsylvanien wurde von dem „Pennsylvania Bureau of animal industry“

ein Tilgungsverfahren ins Leben gerufen, das analog dem in der Viehzucht üblichen Tuberkulose-Tilgungsverfahren durchgeführt wird. Die angeschlossenen Farmer müssen mehrere Male im Jahre ihren Hühnerbestand serologisch untersuchen lassen; die positiven Tiere werden innerhalb 14 Tagen geschlachtet, die Desinfektion der Stallungen wird vorgeschrieben, dazu kommen noch Verhaltensmaßregeln, die bei der Brut und Aufzucht beachtet werden müssen (Niemann<sup>76</sup>). Rettger<sup>84</sup> weist immer wieder auf die Notwendigkeit einer einheitlichen Durchführung der Blutuntersuchung hin, so schlug er auf der zweiten Tagung der mit der Bekämpfung der Kükenruhr beschäftigten Institute eine Standardisierung der Testflüssigkeit vor; ein Ausschuß stellt geeignete Bakterienstämme fest und gibt einheitliche Richtlinien für die Herstellung an.

In Belgien befaßen sich die Züchtervereinigungen energisch mit der Bekämpfung der Pullorumseuche. Bestände, die sich den vorgeschriebenen Untersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen unterwerfen, werden als „anerkannte Stämme“ besonders gekennzeichnet (Leynen<sup>62</sup>). In England gelten nur solche Stämme als „geprüfte Stämme“, die zweimal innerhalb 3 Monaten serologisch untersucht sind (Doyle<sup>24</sup>).

Aus der umfangreichen Literatur über die Pullorumseuche geht deutlich hervor, welche große Bedeutung man von seiten der Forscher dieser Krankheit beimißt. Trotz großen Eifers ist es aber noch nicht gelungen, alle Fragen, besonders der Epidemiologie und Bekämpfung restlos zu klären, wie in den verschiedenen Ansichten der Autoren klar zu Tage kommt.

Am Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz war mir nun dank dem lebenswürdigen Entgegenkommen des Direktors, Herrn Dr. H. Eickmann, Gelegenheit geboten, Untersuchungen über die Pullorumseuche anzustellen. Sie erstreckten sich auf folgende drei Fragen:

1. Hat die verschiedenartige Haltung positiv reagierender Hühner einen Einfluß auf den Agglutinationstiter?
  2. Ergeben sich Unterschiede bezgl. der Übertragung von Huhn auf Küken bei verschiedenartiger Haltung positiv reagierender Hühner?
  3. Welche Agglutinationsmethode eignet sich am besten für die serologische Untersuchung der Hühnerbestände, und ist die Verwendung eines Standardtrockentestes möglich?
-

## Eigene Untersuchungen.

### Zur Frage 1:

#### **„Hat die verschiedenartige Haltung positiv reagierender Hühner einen Einfluß auf den Agglutinationstiter?“**

In der Literaturzusammenstellung ist schon darauf hingewiesen, daß die Ergebnisse der Agglutination manchmal so großen Schwankungen unterworfen sein können, daß der gewünschte Erfolg in Frage gestellt wird. So zeigten in einem Bestand, der von uns untersucht wurde, von 132 Tieren, die das erste Mal negativ reagierten und als Zuchthennen Verwendung finden sollten, 50 (38 %) bei der 2—3 Monate später vorgenommenen Kontrolluntersuchung eine einwandfreie positive Agglutination, während von 111 positiv reagierenden, im Legestall untergebrachten Hennen 10 (9 %) bei der zweiten Untersuchung negativ reagierten. In einer anderen Farm reagierten von 93 Hühnern, deren Serum bei der ersten Untersuchung in einer Verdünnung von 1:100 positiv reagiert hatte, bei der erneuten Agglutination nach 2—3 Monaten nur noch 2 positiv. Der Besitzer der erwähnten 93 Hühner teilte uns mit, daß er die Tiere nach der ersten Untersuchung äußerst sauber gehalten und gut gepflegt hätte und führte darauf die negative Reaktion zurück. Diese Mitteilung und die ungeheure Divergenz der Untersuchungsergebnisse gaben uns Veranlassung zu entsprechenden

Unterfuchungen. Zu diefem Zweck wurden aus einem Beftand mit ungefähr 65<sup>00</sup> infizierten Tieren 60 zweijährige Hühner der weißen Wyandotte-Raffe mit positiver Reaktion angekauft, die wegen der ftarken Verfeuchung des Beftandes vom Befitzer zur Ausmerzung beftimmt waren. Die Tiere befanden fich zum größten Teil in einem guten bis fehr guten Nährzuftand, nur einige waren mäßig genährt, machten aber einen munteren Eindruck. Bei Ankunft der Tiere fiel uns auf, daß verfchiedene an ftarkem Durchfall litten. Nach Verabreichung einer fchwachen Chinosollöfung im Trinkwaffer ging die Erfcheinung wohl ftark zurück, verlor fich aber bei einigen Hennen während der ganzen Beobachtungszeit nicht.

Da gleich zu Anfang unferer Verfuche ein Tier an Halswirbelbruch, eins infolge Kloakenvorfall und zwei an innerer Verblutung aus der Leber eingingen, konnten wir nur mit 56 Hühnern unfere Unterfuchungen durchführen.

Die Versuchshühner wurden in zwei Abteilungen eingeteilt. Unferer Aufgabe gemäß wurden die beiden Gruppen unter ganz verfchiedenen Bedingungen gehalten. Gruppe A (33 Tiere) wurden in einem Stall von ungefähr 20 qm Bodenfläche untergebracht. Zu denfelben fetzten wir noch einen Leghornhahn, der feit langer Zeit in unferem Befitz war und ftets negativ reagiert hatte. Somit arbeiteten wir in diefer Abteilung mit 34 Tieren. Wir legten bei diefem Stall größten Wert auf Unfauberkeit. Der Boden war mit Zementplatten ausgelegt, die Wände beftanden aus Drahtgitter, das Dach aus Glas. Der Kot wurde während der ganzen Verfuhszeit (6 Mon.) kein einziges Mal entfernt, fodaß er ftellenweife bis zu einer 10—15 cm dicken Schicht heranwuchs. Das Futter wurde nicht in Trögen verabreicht, fondern möglichft durch den ganzen Stall verftreut. Als Trinkwafferbehälter dienten mehrere Blechbüchfen, die ab und zu von dem größten Schmutz befreit wurden. Mehrere in ungefähr 70 cm Höhe angebrachte Stangen boten Sitzgelegenheit.

Bei der Gruppe B (23 Tiere) legten wir im Gegenfaß zur Gruppe A den größten Wert auf Sauberkeit.

Aus diesem Grunde ließen wir zwei Ställe anfertigen von zusammen 5 m Länge, 1 m Tiefe und 1½ m Höhe. Die Vorderwand bestand aus Maschendraht, die Seitenwände aus Holz. In halber Höhe war ein durch Dachpappe undurchlässig gemachter Boden angebracht, sodaß wir also einen Etagenstall hatten. Um den Tieren keine Gelegenheit zu geben, ihren eigenen Kot wieder aufzunehmen, war ungefähr 10 cm über dem undurchlässigen Boden ein Rahmen mit Maschendraht angebracht, auf dem die Tiere sich aufhielten. Diese Drahtböden wurden jeden Morgen mit einem harten Besen gründlich gefäubert. Die Exkremeute, die sich auf der Kotplatte ansammelten, wurden alle 2—3 Tage entfernt und in den A Stall geschüttet. Als Futter- und Trinkgeschirr dienten Blechtröge, die vor jedem Stall so angebracht waren, daß eine Beschmutzung seitens der Hühner nicht in Frage kam, sie wurden täglich einer gründlichen Reinigung unterzogen. Falls das Bakterium pullorum in den Ausscheidungen vorhanden war, konnte eine Reinfektion bei der unsauberen Haltung im Stall A immer erfolgen, in dem sauberen Stall B war die Möglichkeit auf ein Minimum herabgesetzt.

Daß der Erreger ausgeschieden werden kann, wurde durch die Ergebnisse der Untersuchungen von Hof<sup>47</sup>, Konno<sup>54</sup>, Mießner und Berge<sup>73</sup> bewiesen, die das Bakterium in der Kloake, im Eileiter, in der Niere und Galle nachwiesen. Auch ich stellte diesbezügliche Untersuchungen bei den Versuchstieren an. 43 Kotproben wurden auf die Anwesenheit des Bakteriums untersucht. Der Kot wurde z. T. vom Kotbrett der Käfige gesammelt, z. T. auch direkt aus der Kloake entnommen, dadurch, daß wir die Hennen zur Defäkation trieben. Dieses geschah durch Einlauf von im Eisschrank gekühltem, destilliertem Wasser mittels einer Pipette in die Kloake. Der Kot wurde in einem Mörser unter Zusatz von physiologischer NaCl-Lösung zu einem Brei verrührt und dann durch vierfache Gaze filtriert. Eine Oese voll dieser Aufschwemmung wurde auf einer Gaßnerplatte ausgestrichen und dann bebrütet. Gleichzeitig wurde auch

noch jede Aufschwemmung nach der Hoderfchen Methode angereichert. Es gelang aber weder direkt noch indirekt mittels der Hoderfchen Anreicherungs-methode das Bakterium pullorum nachzuweisen. Wohl wuchsen auf der Gaßnerplatte in 16 Fällen nach 24 stündigem Brutfrankaufenthalt Bakterien in gelblichen Kolonien, die aber bei der serologischen Untersuchung mit Pullorumserum inagglutinabel waren und auf Grund ihres morphologischen und biochemischen Verhaltens auf der bunten Reihe zur sogenannten Intermediusgruppe gerechnet werden mußten. Doch dürfte das Ergebnis der späteren bakteriologischen Untersuchung bei den eingegangenen bzw. geschlachteten Tieren Beweis genug sein, daß das Bakterium zeitweise in den Ausscheidungen vorhanden war, wir konnten nämlich drei mal den Erreger aus dem Eileiter isolieren. Durch das üppige Wachstum der zahlreichen im Kot vorhandenen Kolibakterien werden die fein wachsenden Pullorumbakterien überwuchert, was durch nachstehende Kontrolluntersuchung bewiesen wurde.

Je eine halbe Oese Koli- und Pullorumbakterien wurden in einem Reagenzglas voll physiologischer Kochsalzlösung verteilt, nach gehöriger Durchmischung wurde sodann eine Oese voll dieser Suspension auf einer Gaßnerplatte ausgestrichen. Nach 24 stündigem Bebrüten waren nur zahlreiche dunkelblaugrüne Kolikolonien gewachsen. Verteilten wir dagegen nur eine halbe Oese voll Pullorumkulturen in einem Reagenzglas voll physiologischer NaCl-Lösung und brachten von dieser Suspension eine Oese voll auf eine Gaßnerplatte, dann wuchsen zahlreiche feine, leicht gelbliche Kolonien. Auch bei der Hoderfchen Anreicherungs-methode zeigte sich daselbe.

Die Fütterung war in beiden Ställen dieselbe. Es wurden pro Tier und Tag ungefähr 50—60 g Muskatormilchfutter verabreicht, außerdem gekochte Fleischstücke und andere Küchenabfälle, etwas Fischmehl und Futterkalk. An Grünfutter erhielten die Hühner fast täglich Gras, Klee oder Wicken, je nachdem es im Institut vorrätig war. Da wir den Tieren keinen Auslauf bieten

konnten, wurde ihnen des öfteren Sand und Kieselsteinchen mit dem Körnerfutter gegeben. Bei dieser Futterzusammenstellung hielten sich die Hennen sehr gut.

Die Legeleistung ließ allerdings sehr zu wünschen übrig; wir erhielten täglich nur 4—8 Eier, besonders nach jeder Blutentnahme sistierte die Legeleistung für die nächsten Tage fast ganz.

Die Blutuntersuchung wurde im ersten Monat ungefähr in 8—10 tägigen Pausen vorgenommen, in den letzten Monaten vergrößerten wir die Abstände auf ca. vier Wochen. Das Blut, ungefähr 2 ccm, wurde durch Anrißen der Vena cutanea ulnaris gewonnen. Wenn wir auch ab und zu bei einigen Tieren stärkere Nachblutungen hatten, hielten wir ein Zubrennen der Wunde mittels glühenden Messers nicht für erforderlich. Vor der Blutentnahme ließen wir die Tiere nicht hungern. Die Blutproben wurden noch am selben Tage verarbeitet. Die Agglutinationen wurden in fortlaufender Serumverdünnung in kleinen Agglutinationsröhrchen vorgenommen, zu 1 ccm Serumverdünnung wurde 0,1 ccm Testflüssigkeit hinzugefügt. Als Test verwandten wir die Abschwemmung von zwölf ausgesuchten, kulturell, morphologisch, serologisch und biochemisch geprüften, aus verschiedenen Beständen und Gegenden stammenden Pullorumstämmen, unter denen sich zwei gasbildende befanden. Wir fügten aus dem Grunde nur zwei gasbildende Stämme hinzu, weil wir bei den umfangreichen biochemischen Untersuchungen die Beobachtung machten, daß im hiesigen Institut hauptsächlich solche Stämme aus den Kadavern gezüchtet wurden, die in Traubenzucker kein Gas bildeten. Auch die aus den eingegangenen Versuchshühnern gezüchteten Stämme erwiesen sich als gaslos. Zur Abschwemmung der frisch angelegten 24 stündigen Agar-schräggkulturen nahmen wir physiologische Kochsalzlösung, der wir 0,1% Formalin zusetzten. Die Dichte wurde so gewählt, daß man nach Abfüllen in ein Reagenzglas Druckschrift noch lesen konnte (Mießner und Berge<sup>73</sup>). Das Resultat wurde nach ca. 16 bis 20 stündigem Brutschrank-

aufenthalt abgelesen, die Ablebung erfolgte mit bloßem Auge ohne Zuhilfenahme des Agglutinoskops.

Zunächst war es erst einmal unsere Aufgabe, bei jedem Tier den Agglutinationstiter zu ermitteln, was uns durchweg bei der zweiten Blutuntersuchung schon gelang. Hierbei mußten wir feststellen, daß er bei den meisten Hennen sehr hoch lag. Bei der zweiten Untersuchung fanden wir bei 5 Tieren noch eine Agglutination bei einer Serumverdünnung 1:25600, die meisten Werte bewegten sich aber zwischen den Verdünnungen 1:400—1:6400. Im Laufe der Untersuchung stellten wir des öfteren einen Agglutinationstiter von 96000 fest.

Bei den folgenden serologischen Untersuchungen wurden dann jedesmal 3 Verdünnungen angelegt, die so gewählt wurden, daß der vorher gefundene Titer in der Mitte lag. Hatten wir z. B. bei einem Huhn den Titer 1:1600 ermittelt, dann wurden bei der nächsten Agglutination die Verdünnungen 1:800, 1:1600 und 1:3200 angelegt. Hatten wir dabei nicht die richtige Verdünnung getroffen, d. h. war der Titer mittlerweile derart gestiegen oder gefallen, daß das Serum überhaupt nicht oder bei allen 3 angelegten Verdünnungen agglutinierte, dann setzten wir am 2. Tage von demselben Serum, daß bei +2 bis +40 im Kühlschrank aufbewahrt wurde, noch einmal 3 entsprechende Agglutinationen an. So gelang es uns dann fast immer, den Titer zu bestimmen. Die gefundenen Agglutinationswerte sind aus der Tabelle 1 (S. 61/62) zu ersehen. Aus der Tabelle geht hervor, daß die Blutwerte aller Hennen mehr oder weniger großen Schwankungen unterworfen waren. Der Hahn, der in der Gruppe A, also bei den „unsauberen Hühnern“ untergebracht war, zeigte dauernd eine negative Reaktion, nur am 26.6. und 22.10. stellten wir bei einer Verdünnung 1:10 eine Ausflockung fest, die man aber wohl als eine unspezifische ansprechen durfte. Von den Hennen zeigte keine einzige jemals eine vollständige negative Reaktion, wenn auch der Titer bei Huhn Nr. 21 und Nr. 199 auf 25 bzw. 40 zurückging. Legt man als Grenztiter

der Serumverdünnung 1:50—100 als positiv zugrunde, wie es vielfach geschieht, dann hätten also diese beiden Tiere zeitweise negativ reagiert (3,33%).

Während einige Tiere geringe Titerchwankungen zeigten (Nr. 21, 199, 131, 118, 152, 78), waren bei anderen dagegen große Auf- und Abstiege zu verzeichnen (Nr. 9, 22, 169, 141, 127, 73, 23). Einheitliche Schwankungen waren nicht festzustellen. War bei einigen ein Anstieg zu verzeichnen, fiel der Titer zur selben Zeit bei anderen. Am 20.7. wurden bei einer Anzahl von Hennen überraschend hohe Werte gefunden. Die Ursache dieser Vermehrung der Agglutinine möchte ich in einer Resistenzschwächung der Tiere durch die Mauser suchen, die in diesem Zeitabschnitt sehr stark war.

Die Neigung zum Brüten scheint keinen Einfluß auf den Agglutinationstiter auszuüben, wie ich bei den Hennen Nr. 67, 162, 179 und 21 feststellen konnte. Bei der Blutentnahme am 15.8. zeigten diese Tiere eine große Brutlust, die serologische Untersuchung in dieser Periode ergab folgendes:

| Nr. | 20. 7. 30 | 15. 8. 30 |
|-----|-----------|-----------|
| 67  | 1600      | 1600      |
| 162 | 12000     | 800       |
| 179 | 800       | 3200      |
| 21  | 50        | 40        |

Während also bei Huhn 67 und 21 der Titer ungefähr konstant blieb, fiel er bei Nr. 162 von 12000 auf 800, stieg dagegen bei Nr. 179 von 800 auf 3200.


Um die Titerchwankungen der Hühner aus Stall A und B vergleichen zu können, wurden an jedem Untersuchungstage die Blutwerte der A-Hühner und B-Hühner summiert und durch die Zahl der Tiere dividiert, die ermittelte Zahl war also der Durchschnittstiter. Die gefundenen Werte sind in folgender Tabelle zusammenge stellt:

# Durchschnittsagglutinationstiter

| Datum   | Stall A (unfauber) |         | Stall B (fauber) |         |
|---------|--------------------|---------|------------------|---------|
| 10. 4.  | 1100               | (1100)  | 3000             | (3026)  |
| 16. 4.  | 2100               | (2141)  | 3700             | (3687)  |
| 24. 4.  | 4500               | (4503)  | 8700             | (8730)  |
| 6. 5.   | 2800               | (2794)  | 12500            | (12505) |
| 21. 5.  | 2700               | (2676)  | 5300             | (5295)  |
| 4. 6.   | 3300               | (3333)  | 5900             | (5945)  |
| 26. 6.  | 11100              | (11132) | 13500            | (13445) |
| 20. 7.  | 23300              | (23320) | 22600            | (22600) |
| 15. 8.  | 11600              | (11603) | 13800            | (13820) |
| 17. 9.  | 3900               | (3852)  | 5400             | (5437)  |
| 9. 10.  | 1800               | (1764)  | 2500             | (2514)  |
| 22. 10. | 3400               | (3386)  | 3300             | (3327)  |

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß der Durchschnittstiter beider Ställe gleichfönnigen und fast gleichen Schwankungen unterworfen war.

Diese Einheitlichkeit habe ich durch zwei Durchschnittskurven darzustellen veröucht. Die gestrichelte Linie gibt die Durchschnittsblutwerte der Gruppe A an, die ausgezogene die der Gruppe B.



———— = Durchschnittsblutwert der sauber gehaltenen Hühner,

- - - - - " " " unsauber " "

Durch die zusammenlaufenden Linien soll angezeigt werden, daß der angegebene Blutwert das arithemische Mittel aus einer Summe von Blutwerten ist. Durch die dann folgende punktierte Verbindungslinie soll angedeutet werden, daß es bei der 2. Blutentnahme bei einzelnen Tieren noch nicht gelungen ist, den genauen Titer zu bestimmen. Den ersten Anstieg bei beiden Kurven (bei Gruppe A am 24.4., bei B am 6.5.) glaube ich wiederum mit einer Resistenzschwächung, hervorgerufen durch den schroffen Wechsel in der Haltung und Fütterung, erklären zu können. Der zweite steile Aufstieg wird durch die hohen Agglutinationstiter der in Tabelle 1 aufgeführten Hennen verursacht und fällt mit der Mauserzeit zusammen.

Während der Versuchszeit gingen außer den 4 anfangs erwähnten Hennen noch weitere 3 Tiere ein. Wenn auch bei 3 Hühnern die Todesursache in keinem Zusammenhang mit der Pulloruminfektion zu stehen schien (Halswirbelbruch, Kloakenvorfall, Darmentzündung), so mußte ich doch auf Grund des pathologisch-anatomischen Befundes bei den übrigen 4 Tieren den Tod auf die schädigende Einwirkung des Erregers auf den Organismus zurückführen. Bei 2 Tieren (191 und 170) war der Tod durch innere Verblutung aus der veränderten Leber eingetreten, Huhn Nr. 164 ging an Bauchwassersucht ein. und bei Huhn Nr. 68 war die Todesursache in dem stark veränderten Herzen zu suchen. Die Mortalität an Pulloruminfektion betrug also 6,56%. Durch die bakteriologische Untersuchung wurde bei keinem der eingegangenen Tiere der Erreger aus dem Herzblut isoliert, ein Beweis dafür, daß kein Tier an der septikaemischen Form der Seuche, wie sie bei Küken auftritt, zu Grunde ging.

Wenn man das Auge über den Hühnerbestand gehen ließ, fiel auf, daß mehrere Tiere einen mehr oder weniger ausgeprägten Hängebauch hatten. Bei der Blutentnahme konstatierten wir auch öfters eine Bauchwassersucht. Die betreffenden Tiere zeigten aber dabei gar keine Beschwer-

den. Nur bei Huhn 149 war die Ascites zeitweise so stark, daß es zur Entlastung der Atmungsorgane eine ausgesprochene Pinguinenhaltung einnahm.



Bild 1.

Huhn 149: Pinguinenhaltung infolge Bauchwasserfucht.

### **Sektionsbefund bei den Versuchshühnern.**

Am Ende der Untersuchungszeit wurden alle Hühner bis auf 7 (Nr. 21, 67, 150, 108, 132, 12, 139), die für andere Versuche verwendet werden sollten, geschlachtet. Dadurch war mir Gelegenheit geboten, bei 54 Tieren eine Nachprüfung des serologischen Untersuchungsergebnisses vorzunehmen. Bei der Blutuntersuchung hatte nur der Hahn Nr. 3 dauernd negativ reagiert. Bei Huhn 199 war der Blutwert zeitweise bis unter den Grenztiter 50 zurückgegangen. 48 Tiere zeigten während der ganzen Untersuchungszeit eine positive Reaktion, während bei den 4 gleich zu Beginn der Untersuchung eingegangenen Hennen nur einmal eine starke positive Reaktion festgestellt wurde.

Es würde zu weit führen, wenn ich bei jedem Huhn ausführlich den Sektionsbefund beschreiben würde, ich beschränke mich deshalb darauf, einen allgemeinen Über-

blick über die gefundenen pathologisch = anatomischen Veränderungen zu geben.

In der Tabelle 2 (S. 63/64) ist angegeben, welche Organe bei jedem Huhn typische, durch das Bakterium pullorum hervorgerufene Veränderungen aufwiesen.

Aus der Tabelle geht hervor, daß bei dem negativen Hahn Nr. 3 und bei den Hühnern 199 und 118 überhaupt keine Organveränderungen festgestellt wurden. Das Ergebnis der Blutuntersuchung bei den beiden Hennen war folgendes:

| Nr. | 10.4. | 16.4. | 24.4. | 6.5. | 21.5. | 4.6. | 26.6. | 20.7. | 15.8. | 17.9. | 9.10. | 22.10. |
|-----|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 118 | 400   | 800   | 1600  | 1600 | 800   | 800  | 1600  | 1600  | 3200  | 400   | 200   | 200    |
| 199 | 100   | 200   | 200   | 100  | 100   | 200  | 200   | 400   | 40    | 200   | +     | +      |

Bei 2 von 54 Tieren stimmte also der Sektionsbefund nicht mit dem Ergebnis der serologischen Untersuchung überein. Bei 52 Hühnern wurden typische Organveränderungen gefunden, wodurch also das Ergebnis der Blutuntersuchung in 96,3% pathologisch=anatomisch bestätigt wurde.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, wurden von 53 positiven Tieren Veränderungen ermittelt:

|               |               |            |
|---------------|---------------|------------|
| am Eierstock  | bei 49 Tieren | = 92,5 0/0 |
| am Herzmuskel | „ 38 „        | = 71,7 0/0 |
| am Herzbeutel | „ 17 „        | = 32,1 0/0 |
| an der Milz   | „ 17 „        | = 32,1 0/0 |
| am Bauchfell  | „ 13 „        | = 24,5 0/0 |
| am Darm       | „ 8 „         | = 15,1 0/0 |
| an der Leber  | „ 7 „         | = 13,2 0/0 |
| am Eileiter   | „ 3 „         | = 5,7 0/0  |

Die Veränderungen an den einzelnen Organen waren ganz verschieden stark ausgeprägt. Der Eierstock war bei vielen Tieren vergrößert, bei einigen wieder ganz zurückgebildet, bei mehreren Hennen fanden sich nur einzelne gestielte Dotter, bei anderen zahlreiche. Die Follikel waren erbsen- bis wallnußgroß, ihre Farbe

war schmutzig-gelb bis dunkelschwarzgrün, der Inhalt teils wässrig, teils schmierig, teils festweich bis krümelig und die Dotterhaut manchmal schwartenartig verdickt.

An vielen Herzen fanden sich grauweiße Herde von Stecknadelkopf- bis Bohnengröße, bei einigen war der ganze Herzmuskel grauweiß verfärbt (172, 68, 101). Bei Huhn 68 hatte die Herzspitze denselben Umfang wie die Basis, dadurch bekam das Organ eine eigenartig plumpe, kartoffelähnliche Form; auf diese Veränderung war wahrscheinlich auch der Tod zurückzuführen.

Bei zahlreichen Hennen war auch der Herzbeutel erkrankt, die Wand war oft verdickt und von grauer Farbe, die Flüssigkeit z. T. stark vermehrt. Sodann zeigten sich häufig Verwachsungen mit dem Myokard, bei anderen hatten sich Zotten gebildet, und in einigen Fällen wurden sowohl am Herzen als auch am Epikard kleinste sternförmige Blutungen festgestellt. Solche Blutungen fanden sich bei einigen Tieren an allen serösen Häuten, besonders am Bauchfell. Meistens war dieses dabei schwartenartig verdickt, schmutzig-grau verfärbt und mit einer gelblichen Fibrinschicht bedeckt. — Die Veränderungen waren z. T. so stark, daß die Hennen nicht mehr zu Nahrungszwecken verwendet werden konnten. — Die Fibrinschicht bedeckte dann auch die Darmschlingen und andere Organe. Die Darmwand war bei einzelnen Tieren stark verdickt (mehrere Millimeter bei Nr. 149) dabei zeigten sich unter der Serosa und auch unter der Mukosa punkt- und strichförmige Blutungen. Die einzelnen Schlingen waren z. T. fest miteinander verwachsen. Bei den Tieren, bei denen sich Veränderungen am Darm zeigten, konnte ich auch fast immer Fibrinklumpen in der Bauchhöhle feststellen, die oft zusammengedrückt und zwischen den einzelnen Darmschlingen gelagert waren. Interessant war hier besonders der Befund bei Huhn 149. Wie schon erwähnt nahm das Tier zu Lebzeiten manchmal eine Pinguinhaltung ein, wie sie im Bilde deutlich hervortritt; später verlor sich diese Stellung. Bei der klinischen Untersuchung stellte ich zuerst Fluktuation

fest, nachher konnte ich statt des flüssigen Inhalts nur einen kugelförmigen festen Körper abpalpieren, der die ganze kaudoventrale Partie der Leibeshöhle ausfüllte. Bei der Sektion fand sich ein 248 g schwerer hellgelber, im Innern geschichteter Fibrinklumpen, Flüssigkeit war nicht mehr vorhanden. Das Verschwinden der senkrechten Haltung fand also durch die Sektion seine Erklärung: bei der festen Lokalisation des Fibrins durch die Darm-schlingen, die stellenweise von dem Klumpen eingeschlossen waren, änderte sich der Druck auf die Lungen durch die Pinguinhaltung nicht mehr, wie bei der anfänglichen Wasserfucht, und das Tier nahm wieder eine normale Stellung ein. Der pathologische Befund erschien mir wichtig genug, in einer Aufnahme festgehalten zu werden.




Bild 2.

Huhn 149: Sektionsbefund (248 g schwerer Fibrinklumpen).

Wie aus dem Bilde ersichtlich ist, sind Eierstock, Herz und Milz nur verhältnismäßig wenig verändert. Auch bei Huhn 23 fand ich noch einen ähnlichen etwas mehr zerklüfteten Fibrinklumpen von 187 g. Bei diesem Tiere war der Eierstock auch sehr stark vergrößert und verändert.

Bei 7 Hühnern war die Leber verändert, sie war vergrößert, unter der Serosa waren teils kleine und größere Blutungen, teils stecknadelkopfgroße, graugelbliche Herde zu sehen. Die Farbe des ganzen Organes schwankte zwischen dunkelrotbraun und lehmgelb. Die

Konsistenz war manchmal sehr brüchig, sodaß die Serosa bei leichtestem Druck platzte. Bei 2 Tieren (170 und 191) war der Tod durch Verblutung infolge Ruptur eingetreten. Die Milz war bei vielen Hühnern vergrößert (bis haselnußgroß), bei den meisten fanden sich unter der Serosa stecknadelkopfgroße gelbliche Herde. Der Eileiter war bei den wenigsten Tieren verändert. Nur bei 3 Hennen (Nr. 5, 164, 183) war die Schleimhaut leicht geschwollen und mit einer schmierigen gelblichen Masse bedeckt. Im Lumen fanden sich außerdem noch gelbliche Klumpen, aus denen das Bakterium isoliert werden konnte.

### **Bakteriologische Untersuchung.**

Bei der bakteriologischen Untersuchung wurden Kulturen auf Gaßner, z. T. auch in Bouillon angelegt und zwar aus Herz, Leber, Milz, Eierstock, Eileiter und Darm. Da es uns gleich bei dem ersten verendeten Huhn Nr. 183 nicht gelang, aus 3 veränderten Dottern das Bakterium zu züchten, legten wir bei den später untersuchten Tieren aus möglichst vielen Follikeln an. Hierbei konnten wir die von Mießner und Berge<sup>73</sup> erwähnte Tatsache bestätigen, daß der Erreger nicht aus allen deformierten Dottern gezüchtet werden kann.

Es gelang uns bei 42 Tieren das Bakterium pullorum zu isolieren und zwar 41 mal aus dem Eierstock und 1 mal (bei Huhn 43) nur aus der Leber. Das Ergebnis der Blutuntersuchung von 53 Tieren wurde also in 42 Fällen = 79,2 % durch die bakteriologische Untersuchung bestätigt. Bei 8 = 15,7 % von 51 Tieren mit Organveränderungen gelang es nicht, den Erreger zu isolieren, bei einem Tier Nr. 19 wuchs nur das Bakterium Koli, bei Huhn 112 waren die Dotterfollikel so stark zurückgebildet, daß aus ihnen Kulturen nicht angelegt wurden. Außerdem züchteten wir noch 3 mal den Erreger aus dem Eileiter, 2 mal aus Fibrinklumpen und 1 mal aus Bauchhöhlenflüssigkeit. Aus der Milz konnte das Bakterium nicht gezüchtet werden. Daß der Erreger in 8 Fällen nicht gezüchtet werden konnte, ist aber noch kein

Beweis dafür, daß das Tier nicht mehr das Bakterium in sich gehabt hat, dieses kann sich gerade in einer oder mehreren Dotterblasen aufgehalten haben, aus denen keine Kulturen angelegt wurden.

In der Tabelle sind auch noch der niedrigste und höchste Agglutinationstiter vermerkt. Daraus geht hervor, daß die Höhe des gefundenen Blutwertes in keinerlei Beziehung zu dem pathologisch-anatomischen Befund steht.

Wodurch werden nun die erheblichen Titerchwankungen bedingt? Die starken pathologischen Veränderungen an den Organen bei manchen Tieren lassen vermuten, daß während des akuten Krankheitsstadiums die Bakterien den ganzen Organismus überschwemmen und dann den mächtigen Agglutiningehalt des Blutes bedingen.

Als Beispiel möchte ich wieder das Huhn Nr. 149 anführen. Der Titer wurde an den Untersuchungstagen wie folgt festgelegt:

| Datum:   | 10.4. | 16.4. | 24.4. | 6.5. | 21.5. | 4.6. | 26.6. | 20.7. | 15.8. | 17.9. |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Titer I: | 3200  | 6400  | 25600 | 6400 | 12800 | 6000 | 200   | 200   | 200   | 3200  |

Bis zum 4.6. ging der Titer nicht unter 6000 zurück. In dieser Zeit nahm das Tier wegen Bauchwasserfucht die erwähnte Pinguinenhaltung ein. Nachher kam der Entzündungsprozeß zum Stillstand, und es bildete sich allmählich der 248 g schwere Fibrinklumpen. Auffallend ist nun auch der schroffe Fall des Agglutinationstiters. Bei der letzten serologischen Untersuchung stieg dieser dann wieder auf 3200, vielleicht ist der Krankheitsprozeß in dieser Zeit wieder aufgeflackert.

Nun kann man sich vorstellen, daß bei einer Schwächung des Körpers ein chronischer Prozeß wieder akut werden kann. Da bekanntlich während der Mauserzeit das Geflügel weniger widerstandsfähig ist, so ist es sehr leicht möglich, daß das Bakterium pullorum in dieser Zeit bei einer Anzahl von Versuchshühnern den Organismus überschwemmt hat, was sich in einer auffallend starken Vermehrung der Agglutinine kundgab.

Macht nun ein Huhn nur eine leichte Infektion durch, dann bilden sich auch nur wenig Antikörper im Blut. Bei Abklingen der akuten Krankheitsprozesse, die durch diese leichte Infektion bedingt werden und sich am häufigsten am Eierstock oder Herzen abspielen, gehen die Agglutinine auch allmählich wieder zu Grunde. Erfolgt nun nachher kein erneutes Aufflackern der Krankheit, dann reagiert das betr. Individuum nach einiger Zeit vollkommen negativ. Solche Tiere können dann bei der Sektion typische Organveränderungen zeigen; es besteht sogar die Möglichkeit, daß man den Erreger aus einer vollkommen abgekapselten, gestielten Dotterblase isolieren kann.

Aus diesen Erwägungen heraus muß man unbedingt auf den Standpunkt kommen, daß Tiere, die bei der serologischen Untersuchung auch nur einmal eine positive Reaktion gezeigt haben, den Erreger unter Umständen durch das Ei auf die Küken übertragen können und deshalb als Zuchthennen nicht mehr verwandt werden dürfen. Je häufiger man nun eine Blutuntersuchung vornimmt, desto mehr Bakterienträger werden gefunden. Es ist also auch leicht zu erklären, daß bei einmaliger Untersuchung der gewünschte Erfolg ausbleibt und die Verluste bei der Kükenaufzucht nicht zurückgehen. Die Schuld an den Mißerfolgen darf man dann nicht der serologischen Untersuchung zuschreiben, sondern der Besitzer selbst trägt die Verantwortung.

### Ergebnis:

Zwei Gruppen stark pulloruminfizierter Hühner werden unter ganz verschiedenen Bedingungen (saubere und denkbar unsaubere Stallungen) gehalten. Bei beiden Gruppen zeigten sich in den Titerchwankungen keine Unterschiede. Während in beiden Abteilungen bei einigen Tieren der Titer sich ziemlich konstant in einer Höhe hielt, waren bei anderen große Unregelmäßigkeiten in der Agglutinationshöhe zu verzeichnen. Wenn auch bei keinem Individuum die Agglutinine vollkommen aus dem

Blut verschwanden, so ging der Titer doch bei 2 Tieren (3,33%) zeitweise unter die gebräuchliche Titergrenze (50) zurück.

Während der Mauser sind die Agglutinine im Blut vermehrt.

Die Neigung zur Brut hat anscheinend keinen Einfluß auf den Blutwert.

Bei hochgradig infizierten Tieren geht die Legeleistung auf ein Minimum zurück.

Bei 96,30% der zur Sektion gelangten Tiere zeigten sich typische durch das Bakterium pullorum hervorgerufene Organveränderungen.

Bei 79,20% der Tiere konnte das Bakterium pullorum kulturell nachgewiesen werden.

Nicht alle entarteten Dotterblasen beherbergen den Erreger.

Durch eine einmalige Blutuntersuchung können nicht alle Bakterienträger ermittelt werden.

Je häufiger die Blutuntersuchung vorgenommen wird, desto schneller kommt man zum gewünschten Ziel, zur Seuchenfreiheit des Bestandes.

### Zur Frage 2:

### **„Ergeben sich Unterschiede bezgl. der Übertragung von Huhn auf Küken bei verschiedenartiger Haltung positiv reagierender Hühner?“**

Durch die serologische Untersuchung bei unseren Versuchshühnern stellten wir bei beiden Ställen eine höchstgradige Verseuchung fest. Allerdings gelang es nicht, den Erreger im Kot nachzuweisen, aber die Tatsache, daß bei der am Schluß der Untersuchung vorgenommenen bakteriologischen Untersuchung 3 mal das Bakterium pullorum im Eileiter nachgewiesen wurde, läßt den Schluß zu, daß der Erreger auch zeitweilig mit den Abgängen ausgeschieden wurde. In der Literatur ist schon von verschiedenen Autoren darauf hingewiesen, daß bei Zusammenleben infizierter und gesunder Hühner die Über-

tragungsgefahr gering ist, was ja auch unser Hahn durch seine negative Reaktion bei der Blutuntersuchung bewies. Falls nun eine Übertragung der Krankheit durch die Ausscheidungen überhaupt in Frage kam, glaubte ich das am besten bei jungen Küken merken zu müssen, deren größere Empfänglichkeit ja bekannt ist. Dementsprechend wurden die Versuche angeordnet.

Zunächst ließen wir uns aus einer Mustergeflügel-farm 10 Eintagsküken schicken, die nachweislich von einwandfreien, blutuntersuchten Mutterhennen stammten. Wir versuchten, die kleinen Tierchen gleich nach der Ankunft, also im Alter von höchstens 3 Tagen, zu den Hühnern des Stalles B, also zu den sauber gehaltenen, zu setzen, mußten aber das Unternehmen aufgeben, weil sie dermaßen von den alten Hennen mißhandelt wurden, daß 2 daran eingingen. Durch die bakteriologische Untersuchung konnten wir eine andere Todesursache ausschließen, insbesondere wurde das Bakterium pullorum nicht ermittelt. Die übriggebliebenen 8 Küken wurden 5 Wochen lang von mir gepflegt und entwickelten sich vorbildlich. Nach dieser Zeit setzten wir sie dann trotz großer Bedenken für immer zu den Hühnern des B-Stalles. Wenn auch der Empfang nicht gerade liebevoll war, so gewöhnten sich die alten Tiere nach mehreren Tagen aber doch an ihre jungen Artgenossen. Sämtliche acht Küken entwickelten sich im Laufe der Versuchszeit zu prächtigen Jungtieren, ohne jemals Krankheitserscheinungen zu zeigen.

Da nun bei Küken die Empfänglichkeit für das Bakterium pullorum nach 10 bis 14 Lebenstagen bekanntlich stark abnimmt, war es unser Bestreben, Küken, die nur einige Tage alt waren, mit den infizierten Hennen zusammenzubringen. In der Annahme, daß dies am besten unter dem Schutze einer Glucke möglich sei, setzten wir selbst drei brutluftige Hennen mit je 12 Eiern. Die Bruteier stammten aus derselben Zucht, von der wir auch die Eintagsküken bezogen hatten, waren somit frei von einer Infektion. Trotzdem das zum Brüten benutzte Huhn

Nr. 163 in den ersten Wochen sehr oft das Nest verließ, sodaß die Eier verschiedene Male ganz kalt angetroffen wurden, erzielten wir doch mit 29 lebenden Küken ein Schlupfergebnis von 80,5%. Von den 7 ungeschlüpften Eiern waren 3 während der Brutzeit spurlos verschwunden, 3 waren unbefruchtet und in einem war der Embryo nach ca. 8 — 10 Tagen abgestorben. Durch die bakteriologische Untersuchung wurde bei dem letzteren das Bakterium Koli nachgewiesen.

Von den 29 Küken wurde eins nach 4 Stunden von der Glucke erdrückt, die bakteriologische Untersuchung verlief negativ.

Gleich am Schlupftage wurde die Glucke Nr. 193 mit 11 und Nr. 163 mit 8 Küken in dem Stall A untergebracht, also in dem schmutzigen Raum. Die Glucke Nr. 51 wurde dagegen mit 9 Küken zu der Gruppe B, also zu den sauber gehaltenen Hennen gesetzt. Die Glucken schützten erwartungsgemäß ihre Zöglinge gegen die Überfälle der Stallgenossen.

Am 6. Tage ging ein Küken von Nr. 163 ein. Bei der Sektion fanden sich keine pathologisch-anatomischen Organveränderungen, die den Verdacht einer Pullorum-Infektion zuließen, auch die bakteriologische Untersuchung verlief negativ. Nach vier Wochen ging dann noch ein Tierchen von Glucke 52 an Darmentzündung ein. Auch hier hatte die bakteriologische Untersuchung ein negatives Ergebnis.

Die Fütterung entsprach ganz der bäuerlichen Aufzucht. In der ersten Zeit wurde Reis, hartgekochtes Ei, Milch und feingehacktes Gras gereicht. Die Tiere gediehen alle sehr gut. Unterschiede in der Entwicklung bei den im Stall A oder B untergebrachten Küken bestanden nicht. Von der 3. bis 8. Woche gaben wir allen Tieren als Vorbeugungsmittel gegen Coccidiose ein Spezialpräparat im Trinkwasser.

Von den 29 geschlüpften Küken entwickelten sich 26 zu schönen Jungtieren. Ein Verlust von 10% ist bei

den schwierigen Aufzuchtverhältnissen nicht verwunderlich. An Pullorum-Infektion verloren wir kein Tier.

Wie mochte nun aber die Blutuntersuchung ausfallen? Sobald die Tiere groß genug waren, nahmen wir eine diesbezügliche Untersuchung vor und zwar nach drei Monaten. Bei der Blutentnahme wurde auch zugleich die von Wagener<sup>100</sup>, Mießner und Berge<sup>74</sup> empfohlene Frischblut Schnellagglutination durchgeführt, bei der alle Tiere negativ reagierten. Dieses Resultat wurde dann durch die Röhrchenlangsammethode vollauf bestätigt. Wir setzten von jeder Blutprobe Serumverdünnungen von 1 : 10, 20, 40 und 80 an. Hierbei erwies sich, daß alle Küken bis auf zwei vollkommen negativ reagierten. Das Serum dieser beiden Tiere zeigte bei der Verdünnung 1 : 10 eine schwache Ausflockung, die aber als unspezifisch bezeichnet werden muß. Bei der zweiten Untersuchung nach fünf Wochen änderte sich das bei der ersten Agglutination gefundene Ergebnis insofern etwas, als bei zwei anderen Küken diesmal bei einer Serumverdünnung 1 : 10 eine sehr schwache Ausflockung festgestellt wurde. Auch bei dieser Untersuchung wurde also kein Tier mit Bakterium pullorum behaftet gefunden. Bei der dritten Untersuchung am Ende der Versuchszeit fiel wiederum bei allen Tieren die Agglutination negativ aus.

Die beschriebenen Versuche waren mit einwandfreiem Kükenmaterial durchgeführt, denn sowohl die Eintagsküken wie auch die Bruteier stammten von gefunden Mutterhennen, die sich bei der serologischen Untersuchung als pullorumfrei erwiesen hatten. Die Abgänge von stark positiv reagierenden erwachsenen Versuchstieren bildeten also gar keine Ansteckungsgefahr für gesunde Küken, auch dann nicht, wenn die letzteren unter sehr ungünstigen Verhältnissen gehalten wurden.

Im Gegensatz zu den ersten Übertragungsversuchen bei gefunden Küken mit einwandfreier Abstammung ließ ich nun auch noch Eier bebrüten, die von den eigenen stark verseuchten Versuchshühnern stammten. 2 Glucken

wurden je 12 Eier untergelegt. Leider verließ eine Glucke nach einigen Tagen das Nest. Da ein Erlaß nicht zur Verfügung stand, wurden nur 12 Eier von Huhn Nr. 21 bebrütet. Obgleich diese Henne während der ganzen Brutzeit tadellos saß, schlüpften aus den 12 Eiern nur 5 Küken. Das Schlüpfergebnis stand also mit 41,7% weit hinter dem mit den einwandfreien Eiern (80,5%) zurück. Von den nicht geschlüpften Eiern waren 2 wieder unerklärlicherweise spurlos verschwunden, 2 waren unbefruchtet, in 2 war der Embryo schon nach ca. 7 Tagen abgestorben, in einem war das Küken stecken geblieben. Bei diesem legten wir Kulturen in Bouillon und auf Gaßner aus Dotterlack und Leber an, trotz 72 stündigem Bebrüten blieben die Nährböden steril. Aus den anderen Eiern züchteten wir das Bakterium Koli.

Von den 5 geschlüpften Küken ging eins nach einigen Stunden ein. Da der Dotterlack eröffnet war, legten wir Kulturen aus Herz und Leber in Bouillon und auf Gaßner an. Das Bakterium pullorum wurde nicht gezüchtet, dagegen wuchs aus beiden Organen Koli in Reinkultur. Die 4 lebenden Küken waren alle sehr zart, machten aber einen munteren, lebhaften Eindruck. Da wir die Zahl der Tierchen für unsere Übertragungsversuche zu gering fanden, setzten wir sie nicht zu unseren Versuchshühnern, sondern verwahrten sie mit der Glucke in einer geräumigen Kiste. Es wurde Wert auf größte Sauberkeit gelegt. Die Fütterung war genau so wie bei den anderen Küken. Schon nach einigen Tagen fiel ein Tierchen wegen seines schläfrigen Benehmens auf, der Kopf wurde eingezogen, der Rücken war gekrümmt, Durchfall war noch nicht festzustellen. Unaufhörlich piepte das kleine Wesen. Nach 8 Tagen schien eine Besserung einzutreten, am 10. Tage verschlimmerte sich aber der Zustand wieder. Jetzt stellte sich auch ein grauweißer Durchfall ein, der die Kloakenpartie beschmutzte. Das Tier wurde von Tag zu Tag schwächer und ging am 16. Tage ein. Die Sektion ergab folgendes: Ernährungszustand schlecht, Afterpartie mit grauen Kotmassen ver-

schmiert, die Lungen sind sehr blutreich, im rechten Lungenflügel befindet sich ein erbsengroßer abgekapselter Herd mit nekrotischen Massen, der Dotterfack ist bohngroß, von graugelber Farbe; der Inhalt grüngelb, von festweicher Konsistenz.

Bei der bakteriologischen Untersuchung wurden Kulturen auf Gaßner aus Herz, Leber, Dotterfack u. dem Lungenherd angelegt. Nach 48 Stunden wuchs aus Leber, Dotterfack und Lunge das Bakterium pullorum in Reinkultur.

Bei den anderen 3 Tieren ließ auch trotz guter Pflege die Entwicklung zu wünschen übrig. Das Federkleid war immer etwas aufgeplustert, der Rücken leicht gekrümmt. Nach sechs Wochen fiel ein Küken wegen seiner Teilnahmslosigkeit auf, es sonderte sich ab und hockte in einer Ecke. Die Augen waren geschlossen, dann und wann pickte es noch einige Reiskörnchen auf. Das Tier litt an Durchfall, der Kot war dunkelgrau. Die Kräfte wurden zuletzt so gering, daß das Tier schon bei leichtem Anstoß umfiel. Nach 5 Krankheitstagen trat der Tod ein. Bei der Sektion wurde neben starker Abmagerung eine Schwellung der Darmschleimhaut festgestellt. Coccidien wurden nicht nachgewiesen. Alle anderen Organe zeigten keine pathologischen Veränderungen.

Bei der bakteriologischen Untersuchung wurden Kulturen aus Herz, Lunge, Leber und Darm auf Gaßner angelegt, nach 48stündigem Brutschrankaufenthalt war aus der Leber das Bakterium pullorum in Reinkultur gewachsen.

Die beiden am Leben gebliebenen Küken blieben in der Entwicklung sehr zurück. Nach dem unsauberen, glanzlosen Federkleid und der lässigen Haltung beider Tiere zu urteilen, mußte man annehmen, daß auch diese Tiere mit dem Bakterium pullorum infiziert waren. Die serologische Untersuchung bestätigte diese Annahme, bei beiden Tieren wurde mittels der Frischblut Schnellagglutinationsmethode eine positive Reaktion festgestellt. Auch die nach ca. 3 Wochen wiederholte Blutuntersuchung zeigte wieder beide als positiv an.

Trotzdem also die Küken aus den Eiern von stark positiv reagierenden Hennen unter viel saubereren Verhältnissen gehalten wurden als ein Teil der von den gefunden Mutterhennen stammenden, gingen 2 Tiere (50%) an der Pullorumseuche ein, die anderen beiden Tiere blieben zwar am Leben, zeigten aber durch ihre positive Blutreaktion, daß auch sie infiziert waren.

Welche Schlüsse darf man nun aus diesen Versuchen ziehen?

Durch das gute Gedeihen der ersten Küken, die aus einwandfreien Eiern stammten, und durch die negative Blutreaktion dieser Tiere wird bewiesen, daß in dem Zusammenleben stark positiv reagierender Hennen mit gefunden Küken keine Gefahr für letztere liegt. Wenn nun aber die zarten jungen Küken, deren Empfänglichkeit bekanntlich sehr groß ist, nicht angesteckt werden, darf man wohl erst recht annehmen, daß gesunde ältere Tiere auch nicht durch den Kot von kranken Tieren infiziert werden. Bei meinen Versuchen blieb die Reaktion bei dem Hahn trotz dauernden Zusammenlebens mit infizierten Hennen stets eine negative. Falls der Erreger mit den Abgängen ausgeschieden wird, hat er wahrscheinlich seine pathogene Eigenschaft eingebüßt. Anders wird es sein, wenn das Bakterium pullorum von Küken zu Küken durch den Kot übertragen wird, in solchen Fällen scheint das Bakterium noch auf der Höhe der Virulenz zu stehen. Auf Grund dieser Erwägungen wäre es also nicht nötig, positiv und negativ reagierende Hennen schon in der Zeit zu trennen, wo noch keine Bruteier zurückgelegt werden. Die Hähne würden allerdings zu dieser Zeit abzufondern sein, da nach einigen Autoren eine mechanische Übertragung des Erregers von infizierten auf gesunde Hühner möglich ist.

Wenn die Brutversuche mit Eiern von stark positiven Tieren auch wohl nicht umfangreich genug sind, um einwandfreie Schlüsse daraus ziehen zu können, so deuten die Ergebnisse doch darauf hin, daß die Hauptansteckungsgefahr schon von der infizierten Mutterhenne ausgeht,

die den Erreger mit dem Ei auf das Küken überträgt. Auffallend war auch das schlechte Schlupfergebnis bei den infizierten Eiern. Die Erfahrung von Lüttichwager<sup>63</sup>, der mit Eiern aus einem infizierten Bestande sehr gute Schlupf- und Aufzuchtergebnisse hatte, wurde bei unseren Versuchen nicht bestätigt. Es ist nach unseren Erfahrungen eine Hauptbedingung, daß man einwandfreie Eier zu Brutzwecken verwendet, also nur solche Eier, die von Hennen stammen, welche bei mehrmaliger Blutuntersuchung dauernd negativ reagiert haben.

### Ergebnis:

34 Küken, die aus Eiern von pullorumfreien Hühnern stammten und von denen 26 natürlich ausgebrütet waren, wurden zum größten Teil vom ersten Tage an zu stark positiv reagierenden Hennen gesetzt. Weder bei der Sektion der eingegangenen Küken noch bei der Blutuntersuchung der lebenden wurde eine Pullorum-Infektion nachgewiesen.

Bei Küken, die dagegen aus Eiern von stark infizierten Hennen stammten, wurde bei allen Tieren eine Pulloruminfektion nachgewiesen.

Zur Brut dürfen also nur Eier von Muttertieren verwandt werden, die bei mehrmaliger Blutuntersuchung keine positive Reaktion gezeigt haben.

### Zur Frage 3:

**„Welche Agglutinationsmethode eignet sich am besten für die serologische Untersuchung der Hühnerbestände und ist die Verwendung eines Standard-Trockentestes möglich?“**

Daß die Blutuntersuchung ein Hauptfaktor bei der Bekämpfung der Pullorumseuche spielt, wird wohl am besten dadurch bewiesen, daß die Zahl der serologischen Untersuchungen von Jahr zu Jahr zunimmt. Bis zum 31. Oktober wurden im hiesigen Institut in diesem

Jahr (1930) schon über 16000 serologische Untersuchungen vorgenommen, im Jahre 1929 dagegen nur 6420.

Leider ist die Serumlangsammethode sehr umständlich und kostspielig, sodaß es vielen Züchtern nicht möglich ist, eine mehrmalige Untersuchung im Jahre vornehmen zu lassen. Hierin liegt auch der Hauptgrund der mangelhaften Erfolge in vielen Beständen. Durch die von den Amerikanern eingeführte Frischblut Schnellagglutinationsmethode wird die serologische Untersuchung sehr vereinfacht. Die Untersuchung kann sofort bei der Blutentnahme vorgenommen werden, wodurch das Einsenden der Blutproben an die Institute wegfällt. Dadurch wird das Verfahren schon wesentlich verbilligt. Sodann können die infizierten Tiere gleich abgefordert werden, während das bei der Serumlangsammethode erst nach dem Eintreffen der Resultate aus dem Untersuchungsinstitut möglich ist. Man bringt also nur einmal Unruhe in den Hühnerstall, hat somit auch nur einmal den Ausfall an Eiern. Sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Vorteile veranlaßten mich, den Wert der Frischblut Schnellagglutination nachzuprüfen.

Zuerst wurden vergleichende Untersuchungen mit der von Mießner und Berge<sup>74</sup> beschriebenen „Rührtechnik“ vorgenommen. Bei unseren Versuchshühnern, die ja alle stark positiv reagierten, stellte sich nach 3–10 Sekunden prompt eine deutliche Ausflockung ein. Während bei dem negativ reagierenden Hahn und vier anderen gefunden Hennen die Mischung von Blut und Antigen gleichmäßig trüb blieb.

Nach diesen Probeversuchen wurde die Technik bei 285 Tieren einer Farm angewandt. Da wir auch gleichzeitig Blut für die im Institut angelegte Serumlangsamagglutination benötigten, wurde der Blutstropfen aus der Flügelvene entnommen. Von jeder Blutprobe wurde im Institut eine Agglutination bei einer Verdünnung 1:50 und 1:100 angelegt.

Das Ergebnis ist in folgender Tabelle wiedergegeben:

Zahl der untersuchten Tiere: 285

|                       | Serumlangsammethode: | Frischblut Schnellmethode: |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|
|                       | 106 positiv          | 106 positiv                |
| Übereinstimmung       | 119 negativ          | 119 negativ                |
| keine Übereinstimmung | 58 positiv           | 58 negativ                 |
|                       | 2 negativ            | 2 positiv                  |

Aus der Tabelle geht hervor, daß 106 Blutproben bei beiden Methoden eine positive Reaktion gaben, 119 eine negative. Zwei Tiere wurden bei der Frischblut Schnellmethode als positiv ermittelt, die sich bei der Serumlangsammethode als negativ erwiesen. Es muß also angenommen werden, daß es sich bei diesen beiden Proben um eine unspezifische Ausflockung bei der Frischblut Schnellagglutination handelte. Daß 56 Tiere, die bei der Serumlangsammethode positiv reagierten, bei der Schnellagglutination nicht erfaßt wurden, lag daran, daß die einzelnen Proben nicht lange genug beobachtet, sondern schon nach 10 bis 15 Sekunden beiseite gelegt wurden. Auf diesen Fehler wurden wir im Laufe der Untersuchung durch mehrere Blutproben hingewiesen. Nach einer Beobachtungszeit von ca. 5 Minuten stellte sich bei diesen noch eine Ausflockung ein. Das Ergebnis konnte später durch die Langsamagglutination in Röhrchen bestätigt werden.

Da bei der „Rührtechnik“ das Blut mit dem Antigen vermischt werden muß, ist es erforderlich, daß der Blutstropfen ungefähr in der Mitte des Objektträgers aufgefangen wird, was bei unruhigen Tieren durchaus nicht so einfach und manchmal auch sehr zeitraubend ist. Bei der von Wagener<sup>100</sup> beschriebenen „Ausstrichmethode“ hebt man einfach mit der Schmalseite des Objektträgers einen Blutstropfen von der angeritzten Flügelvene ab und breitet ihn dann mit dem „Ausstreicher“ über den Objektträger aus. Dann hat die Ausstrichmethode noch den Vorteil, daß das Mischungsverhältnis zwischen Blut und Antigen besser und schneller geregelt wird, wie ich das an anderer Stelle<sup>97</sup> schon ausführte. Zunächst wurde auch diese Ausstrichmethode wieder bei unseren Versuchs-

hühnern angewandt. Das Ergebnis stimmte vollkommen mit dem der Rührtechnik überein. Wegen der erwähnten Vorteile wurde dann bei späteren Untersuchungen die Wagener'sche Methode angewandt. Bei 656 Blutproben konnte das Ergebnis der Frischblut Schnellagglutinationsmethode durch die Serumlangsamagglutination nachgeprüft werden.

Das Ergebnis war folgendes:

Zahl der untersuchten Tiere: 656.

|                       | Serumlangsammethode: | Frischblut Schnellmethode: |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Übereinstimmung       | 240 positiv          | 240 positiv                |
| (96,04%)              | 390 negativ          | 390 negativ                |
| keine Übereinstimmung | 6 negativ            | 6 positiv                  |
| (3,96%)               | 20 positiv           | 20 negativ                 |

Aus der Tabelle geht hervor, daß bei 630 Proben beide Methoden übereinstimmten. Sechs Blutproben erwiesen sich bei der Schnellmethode als positiv, während die Röhrchenagglutination negativ ausfiel. Auch hier muß man wieder an eine unspezifische Ausflockung bei der Schnellmethode denken. 20 Hennen wurden bei der Frischblut Schnellagglutination als negativ ermittelt, die Serumlangsamagglutination fiel dagegen positiv aus. Leider war es nicht möglich, bei diesen „zweifelhaften“ Tieren eine nähere Untersuchung vorzunehmen.

Die Zeit, in der die Agglutination eintritt, ist sehr verschieden und schwankt zwischen 5—10 Sekunden bis zu 5—10 Minuten. Durchweg steht die Einwirkungs-dauer von Blut und Test bis zur sichtbaren Ausflockung im umgekehrten Verhältnis zu der Titerhöhe, wie ich bei unseren Versuchshühnern feststellen konnte. Es kamen aber auch Fälle vor, wo trotz starkem Agglutiningehalt des Blutes die Ausflockung erst nach verhältnismäßig langer Einwirkungs-dauer sich einstellte.

Die Art der Ausflockung ist ebenfalls sehr verschieden, neben groben Flocken findet man manchmal auch nur ganz feine, sodaß eine richtige Beurteilung erst nach längerem Einarbeiten möglich ist. Auch hier steht die

Stärke der Agglutination nicht immer im Verhältnis zur Titerhöhe; während bei mehreren Versuchshühnern trotz hoher Blutwerte dauernd eine sehr feine, körnige Agglutination beobachtet wurde, stellten sich bei Blutproben von schwach positiv reagierenden Tieren häufig ungemein große und deutliche Ausflockungen ein. Durch unsere vergleichenden Untersuchungen konnte die Erfahrung von Wagener bestätigt werden, daß die Frischblut Schnellmethode ungefähr alle Tiere als positiv anzeigt, deren Serum bei der Langsam methode in einer Verdünnung von 1:50 noch agglutiniert.

Trotz der geringen Differenzen bei unseren vergleichenden Untersuchungen muß man der Frischblut Schnellmethode wegen ihrer technischen und wirtschaftlichen Vorteile den Vorrang überlassen.

Die Hauptrolle bei der Frischblut Schnellmethode spielt ohne Frage die Testflüssigkeit. Es wäre wünschenswert, wenn auch in Deutschland einheitliche Richtlinien zur Herstellung der Testflüssigkeit von einer Zentrale aus gegeben würden, wie es in Amerika schon der Fall ist.

In diesen Richtlinien müssen die verwandten Stämme genau angeführt werden, sodann muß die Art des Nährbodens, die Zeit des Bebrütens und die Beschaffenheit und Menge der zur Abchwemmung gebrauchten Kochsalzlösung genau festgelegt werden, um eine einheitliche Durchführung der Schnellagglutination zu gewährleisten. Noch mehr Garantie für eine einheitliche Untersuchung würde ohne Frage gegeben, wenn das Antigen nur in einem Zentralinstitut angefertigt würde und dann von dort bezogen werden könnte. Die kurze Haltbarkeitsdauer läßt aber wahrscheinlich eine solche Regelung nicht zu.

Ich stellte nun Versuche mit einem Trockentest an, wobei ich mich von dem Gedanken leiten ließ, daß in trockener Form die agglutinable Substanz der Bakterien vielleicht länger bestehen bleibt als in eine Aufschwemmung.

Zur Herstellung dieses Trockentestes nahm ich 12 morphologisch, biochemisch, kulturell und agglutinatorisch geprüfte Stämme, dieselben, die ich bei meinen serolo-

gischen Untersuchungen verwendet hatte. Ich legte Wert auf möglichst große Verschiedenheit hinsichtlich Herkunft, Wachstum und biochemischer Reaktion. Jeder Stamm wurde mit einem Drigalskiipatel auf einem in einer Kolleschale ausgegossenen Agarnährboden ausgestrichen. Nach 48 stündigem Bebrüten waren die Kulturen in einer mehr oder weniger starken Schicht gewachsen. Die 12 Schalen wurden nun mit möglichst wenig (25 bis 30 ccm) Flüssigkeit abgeschwemmt und durch einen Wattebausch filtriert, die gewonnene Bakterienaufschwemmung war stark milchig getrübt.

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Zum Abschwemmen benutzte ich |                             |
| bei Test I                   | destilliertes Wasser,       |
| bei Test II                  | physiologische NaCl-Lösung, |
| bei Test III                 | 4% NaCl-Lösung.             |


Das Wasser der Abschwemmung wurde nun in dem Faust-Heim'schen Trocknungsapparat<sup>39</sup> bei mäßiger Temperatur (25°) eingedampft. Die Bakterien bedeckten als lackähnlicher, gelblicher Überzug den Boden der Eindampfungschale. Dieser Bodensaß wurde unter sterilen Kautelen abgekratz und in einem Mörtel zu einem Pulver verrieben, das einen spezifischen, süßlichen Geruch hatte. Dieser Trockentest wurde in einer kleinen Flasche mit Glasstopfen aufbewahrt. Bei den folgenden Untersuchungen wurde dann eine kleine Messerspitze voll Testpulver in einem Mörtel mit so viel physiologischer Kochsalzlösung vermengt, bis die Aufschwemmung die gewünschte Dichte hatte.

Der Wert und die Haltbarkeit des Trockentestes wurde nun dadurch geprüft, daß in bestimmten Zeitabständen fortlaufende Agglutinationen bei einer Serumverdünnung von 1 : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 und 12800 von den 3 Trockentestarten angelegt wurden. Zum Vergleich wurden gleichzeitig fortlaufende Agglutinationen mit einer von denselben Stämmen hergestellten frischen Testflüssigkeit und außerdem mit einer Testflüssigkeit angelegt, die gleichzeitig mit dem Trockentest angefertigt und dann im Kühlschrank aufbewahrt wurde. Zur

Abchwemmung der gewöhnlichen Testflüssigkeit wurde physiologische NaCl-Lösung mit 0,1% Formalin verwandt.

Zunächst wurde noch von allen 3 Trockentestarten eine dicke Aufschwemmung angefertigt und damit bei den Versuchshühnern die Frischblut Schnellagglutination vorgenommen. Bei allen Blutproben stellte sich nach kurzer Zeit eine Ausflockung ein, was also ein Beweis war, daß die agglutinable Substanz der Bakterien durch das Trocknen nicht vernichtet war. Allerdings hatte sie etwas gelitten, wie aus den Ergebnissen einer fortlaufenden Agglutination vor und nach dem Trocknen hervorgeht. Vor dem Eindampfen war bei einer Serumverdünnung 1:6400 noch eine Agglutination festzustellen, nach dem Prozeß dagegen nur noch bei einer Verdünnung von 1:3200.

In den folgenden Kurven sind nun die Ergebnisse der weiteren Untersuchung auf Haltbarkeit graphisch dargestellt:



Aus der graphischen Darstellung geht hervor, daß die gewöhnliche im Eisschrank aufbewahrte Testflüssigkeit nach 8 Tagen schon etwas geschwächt ist und der Titer im Laufe der Untersuchungen allmählich von 1:3200 auf

1 : 800 fällt. Die agglutinable Eigenschaft aller 3 Trockentestarten leidet aber wesentlich mehr, nach vier Wochen ist der Titer bei Test I und III schon auf 1 : 400, bei Trockentest II sogar schon auf 1 : 200 gefallen. Bei den Untersuchungen nach 6 Wochen finden wir nur bei Trockentest III noch eine schwache Agglutination bei einer Serumverdünnung 1 : 100, während bei den anderen beiden gar keine Agglutination mehr beobachtet wird.

Die Versuche zeigten also, daß auch bei getrockneten Bakterien die agglutinable Substanz vernichtet wird und zwar noch schneller als bei einer im Kühlschrank aufbewahrten Bakterienaufschwemmung gleichen Alters. Gleichzeitig wurde auch festgestellt, daß man zur Agglutination möglichst frisches Antigen verwenden muß. Über zwei Wochen alte Testflüssigkeit sollte nicht mehr benutzt werden, da sonst die Ergebnisse der Agglutination darunter leiden könnten.

### Ergebnis:

Bei ungefähr gleichbleibenden Resultaten hat die Frischblut Schnellagglutinationsmethode große technische Vorteile, sodaß sie unbedingt empfohlen werden kann.

Da die Testflüssigkeit die Hauptrolle bei der Schnellmethode spielt, ist es unbedingt notwendig, einheitliche Richtlinien zur Herstellung von einer Zentrale aus aufzustellen.

Versuche, einen Standardtrockentest herzustellen, fielen ungünstig aus,

Über zwei Wochen alte Testflüssigkeit darf nicht mehr zur serologischen Untersuchung verwandt werden.

---

### **Zusammenfassung.**

Aus den angeführten Versuchen ist folgendes zu entnehmen:

1. Die verschiedenartige Haltung positiv reagierender Hühner, ob in hygienisch einwandfreien oder unsauberen Ställen, übt keinen Einfluß auf den Agglutinationstiter aus.

Schwankungen des Titers, die bei infizierten Hühnern vorkommen, werden gleichfalls durch die Haltung nicht beeinflußt.

Während der Mauser sind die Agglutinine im Blute vermehrt. Bei hochgradig infizierten Tieren geht die Legeleistung auf ein Minimum zurück.

Die serologischen Ergebnisse konnten in 96,30 % der Fälle durch die Sektion bestätigt werden.

2. Werden gesunde Küken, aus pullorumfreien Eiern stammend, mit stark infizierten Hennen selbst vom ersten Lebenstage an zusammengehalten, so tritt eine Infektion nicht ein, einerlei ob sie in hygienisch einwandfreien oder vollkommen unsauberen Ställen untergebracht sind. In beiden Fällen waren Todesfälle an weißer Kükenruhr nicht zu verzeichnen, auch blieb die serologische Reaktion für die ganze Dauer der Versuche (ca. 6 Monate) eine negative.

Im Gegensatz hierzu erkrankten unter gleichen Bedingungen selbst im hygienisch einwandfreien Stalle Küken aus Eiern einer pulloruminfizierten Henne an weißer Kükenruhr und gingen ein. Überlebende zeigten schon im Alter von ca. 10 Wochen positive Blutwerte.

3. Die Frischblut Schnellagglutinationsmethode hat gegenüber der Serumlangsamagglutinationsmethode große technische und wirtschaftliche Vorteile.

Um überall möglichst einheitliche Ergebnisse zu erzielen, wäre die allgemeine Verwendung einer Standardtestflüssigkeit, am besten in einem Zentralinstitut hergestellt, anzustreben.

Versuche hierzu, dieses mittels eines Standardtrockentestes zu erreichen, schlugen fehl.

Tabelle 1.  
**Agglutinationswerte**  
**an den Untersuchungstagen.**  
a) der unfauber gehaltenen Hühner.

| Nr.    | 10. 4. | 16. 4. | 24. 4. | 6. 5. | 21. 5. | 4. 6.   | 26. 6. | 20. 7. | 15. 8. | 17. 9.      | 9. 10. | 22.10. |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| Hahn 3 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0       | 10     | 0      | 0      | 0           | 0      | 10     |
| 21.    | 100    | 200    | 100    | 100   | 100    | 50      | 25     | 50     | 40     | Brutperiode |        |        |
| 199.   | 100    | 200    | 200    | 100   | 100    | 200     | 200    | 400    | 40     | 200         | +      | +      |
| 107.   | 1600   | 6400   | 6400   | 3200  | 6000   | 3200    | 6000   | 400    | 1600   | 1600        | +      | +      |
| 131.   | 800    | 1600   | 800    | 400   | 1600   | 800     | 1600   | 1600   | 3200   | 3200        | 3200   | 3200   |
| 179.   | 800    | 1600   | 1600   | 1600  | 800    | 1600    | 400    | 800    | 3200   | 1600        | 800    | 1600   |
| 30.    | 400    | 1600   | 1600   | 3200  | 1600   | 3200    | 3200   | 1600   | 6000   | 1600        | 800    | 1600   |
| 67.    | 1600   | 800    | 800    | 800   | 1600   | 3200    | 6000   | 1600   | 1600   | 3200        | 3200   | 1600   |
| 114.   | 1600   | 3200   | 1600   | 3200  | 1600   | 800     | 1600   | 1600   | 6400   | 1600        | 800    | 1600   |
| 118.   | 400    | 800    | 1600   | 1600  | 800    | 800     | 1600   | 1600   | 3200   | 400         | 200    | 200    |
| 136.   | 800    | 800    | 800    | 800   | 800    | 3200    | 3200   | 1600   | 6400   | 1600        | 1600   | 1600   |
| 9.     | 800    | 400    | 800    | 800   | 800    | 1600    | 12000  | 3200   | 6400   | 800         | 1600   | 400    |
| 22.    | 1600   | 3200   | 12000  | 3200  | 12000  | 3200    | 24000  | 6400   | 48000  | 1600        | 1600   | 12800  |
| 150.   | 1600   | 6400   | 6400   | 3200  | 3200   | 3200    | 6400   | 6400   | 12000  | 6000        | 6400   | 1600   |
| 169.   | 1600   | 1600   | 6400   | 3200  | 3200   | 6000    | 24000  | 6400   | 12000  | 6000        | 3200   | 1600   |
| 172.   | 800    | 800    | 1600   | 1600  | 1600   | 800     | 6400   | 3200   | 12000  | 3200        | 400    | 400    |
| 178.   | 800    | 1600   | 3200   | 1600  | 1600   | 800     | 6400   | 6400   | 6400   | 1600        | 800    | 1600   |
| 54.    | 800    | 1600   | 800    | 400   | 800    | 3200    | 6000   | 24000  | 800    | 1600        | 3200   | 1600   |
| 129.   | 1600   | 800    | 3200   | 1600  | 1600   | 1600    | 3200   | 12000  | 1600   | 1600        | 3200   | 800    |
| 141.   | 1600   | 800    | 800    | 800   | 800    | 1600    | 1600   | 12000  | 24000  | 1600        | 800    | 1600   |
| 162.   | 800    | 800    | 3200   | 3200  | 1600   | 1600    | 3200   | 12000  | 800    | 400         | 400    | 800    |
| 127.   | 800    | 1600   | 6400   | 3200  | 3200   | 3200    | 3200   | 48000  | 12000  | 12000       | 800    | 800    |
| 5.     | 3200   | 6400   | 25600  | 6400  | 6000   | 6000    | 12000  | 96000  | 24000  | 24000       | +      | +      |
| 19.    | 800    | 1600   | 1600   | 3200  | 800    | 3200    | 6400   | 48000  | 3200   | 800         | 800    | 1600   |
| 124.   | 1600   | 1600   | 3200   | 12800 | 3200   | 12800   | 24000  | 48000  | 24000  | 24000       | 3200   | 12800  |
| 166.   | 1600   | 6400   | 3200   | 6400  | 1600   | 1600    | 12000  | 96000  | 48000  | 6400        | 1600   | 24000  |
| 189.   | 800    | 1600   | 3200   | 6400  | 6400   | 12800   | 12000  | 96000  | 24000  | 1600        | 1600   | 1600   |
| 35.    | 800    | 6400   | 25600  | 6400  | 12000  | 6400    | 48000  | 96000  | 12800  | 3200        | 3200   | 1600   |
| 73.    | 1600   | 1600   | 800    | 800   | 1600   | 3200    | 96000  | 96000  | 60000  | 3200        | 1600   | 12800  |
| 170.   | 1600   | 3200   | 12800  | 3200  | 3200   | 12000   | 12000  | 12000  | +      | +           | +      | +      |
| 68.    | 400    | 800    | 800    | 400   | 800    | 1600    | 800    | 800    | +      | +           | +      | +      |
| 163.   | 800    | 1600   | 1600   | 6400  | 800    | Brut-   |        | 1600   | 800    | 800         | 800    | 1600   |
| 193.   | 1600   | 1600   | 1600   | 1600  | 3200   | periode |        | 3200   | 400    | 800         | 400    | 200    |
| 23.    | 1600   | 3200   | 12800  | 3200  | 6000   | 3200    | 12800  | 48000  | 6400   | 3200        | 3200   | 3200   |

b) der fauber gehaltenen Hühner.

| Nr.  | 10.4. | 16.4. | 24. 4. | 6. 5. | 21. 5. | 4. 6.       | 26. 6. | 20. 7. | 15. 8. | 17. 9. | 9. 10. | 22.10. |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 149. | 3200  | 6400  | 25600  | 6400  | 12800  | 6000        | 200    | 200    | 200    | 3200   | +      | +      |
| 104. | 3200  | 6400  | 3200   | 3200  | 1600   | 800         | 800    | 400    | 1600   | 800    | 800    | 1600   |
| 63.  | 3200  | 1600  | 3200   | 6400  | 1600   | 800         | 3200   | 800    | 3200   | 3200   | 400    | 400    |
| 152. | 3200  | 1600  | 800    | 800   | 800    | 1600        | 1600   | 800    | 800    | 1600   | 800    | 800    |
| 17.  | 3200  | 3200  | 3200   | 12000 | 3200   | 12000       | 3200   | 3200   | 12000  | 800    | 1600   | 3200   |
| 81.  | 3200  | 6400  | 12800  | 25600 | 6000   | 3200        | 6400   | 3200   | 400    | 800    | 800    | 800    |
| 101. | 3200  | 800   | 3200   | 12800 | 3200   | 3200        | 24000  | 6400   | 12800  | 1600   | 400    | 400    |
| 108. | 1600  | 800   | 1600   | 1600  | 1600   | 800         | 6400   | 6000   | 800    | 1600   | 6400   | 1600   |
| 144  | 3200  | 1600  | 800    | 400   | 800    | 800         | 6400   | 6400   | 6400   | 1600   | 400    | 800    |
| 27.  | 3200  | 800   | 3200   | 12800 | 1600   | 3200        | 3200   | 24000  | 6000   | 800    | 800    | 800    |
| 51.  | 3200  | 6400  | 6400   | 3200  | 3200   | 6400        | 800    | 12800  | 6000   | 12800  | 800    | 400    |
| 78.  | 3200  | 3200  | 12800  | 3200  | 6000   | 3200        | 24000  | 12000  | 24000  | 3200   | 3200   | 3200   |
| 128. | 3200  | 1600  | 1600   | 3200  | 800    | 1600        | 1600   | 12000  | 800    | 800    | 400    | 400    |
| 174. | 3200  | 1600  | 6400   | 12800 | 1600   | 6400        | 3200   | 12800  | 24000  | 1600   | 800    | 6400   |
| 112. | 3200  | 6400  | 25600  | 6400  | 12800  | 6000        | 12000  | 24000  | 24000  | 1600   | 800    | 6400   |
| 132. | 3200  | 6400  | 6400   | 3200  | 3200   | 6000        | 24000  | 12000  | 6400   | 12000  | 3200   | 1600   |
| 139. | 3200  | 800   | 800    | 800   | 1600   | 1600        | 6400   | 48000  | 6400   | 6000   | 1600   | 100    |
| 142. | 3200  | 1600  | 6400   | 12800 | 3200   | 12800       | 6000   | 24000  | 12000  | 3200   | 1600   | 12800  |
| 12.  | 3200  | 6400  | 12800  | 96000 | 25000  | 24000       | 48000  | 96000  | 96000  | 48000  | 24000  | 12800  |
| 24.  | 3200  | 6400  | 6400   | 3200  | 3200   | 12000       | 6400   | 48000  | 24000  | 12000  | 400    | 400    |
| 15.  | 3200  | 6400  | 25600  | 48000 | 12000  | 12000       | 96000  | 96000  | 1600   | 1600   | 3200   | 1600   |
| 52.  | 800   | 1600  | 6400   | 6400  | 3200   | Brutperiode |        | 800    | 400    | 800    | 400    | +      |
| 164. | 3200  | 6400  | 25600  | 6400  | 12800  | 6400        | 12000  | 48000  | 48000  | +      | +      | +      |

Tabelle 2.

# Sektionsbefund

a) der unfauber gehaltenen Versuchshühner

| Nr.<br>des<br>Hüh-<br>nes | Veränderungen wurden<br>festgestellt an: |            |            |           |      |       |      |          | Agglutinations-<br>titer |          | Bact.<br>pullorum<br>nach-<br>gewiesen |
|---------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-------|------|----------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
|                           | Eierfod                                  | Herzmuskel | Herzbeutel | Bauchfell | Darm | Leber | Milz | Eileiter | niedrigster              | höchster |                                        |
|                           |                                          |            |            |           |      |       |      |          |                          |          |                                        |
| 199.                      | —                                        | —          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 25                       | 200      | —                                      |
| 107.                      | +                                        | +          | —          | +         | +    | —     | —    | —        | 400                      | 6400     | +                                      |
| 131.                      | +                                        | +          | —          | +         | +    | —     | —    | —        | 400                      | 3200     | +                                      |
| 179.                      | +                                        | +          | —          | +         | +    | —     | —    | —        | 400                      | 3200     | +                                      |
| 30.                       | +                                        | +          | +          | —         | —    | —     | —    | —        | 400                      | 3200     | +                                      |
| 114.                      | +                                        | —          | —          | +         | +    | —     | —    | —        | 800                      | 6400     | +                                      |
| 118.                      | —                                        | —          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 200                      | 3200     | —                                      |
| 136.                      | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | +    | —        | 800                      | 6400     | +                                      |
| 9.                        | +                                        | +          | —          | —         | —    | +     | +    | —        | 400                      | 12000    | +                                      |
| 22.                       | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | +    | +        | 1600                     | 48000    | +                                      |
| 169.                      | +                                        | —          | +          | —         | —    | —     | +    | —        | 1600                     | 24000    | +                                      |
| 172.                      | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | +    | —        | 400                      | 12000    | —                                      |
| 178.                      | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 800                      | 6400     | +                                      |
| 54.                       | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 400                      | 24000    | —                                      |
| 129.                      | +                                        | —          | +          | —         | —    | —     | —    | —        | 800                      | 12000    | +                                      |
| 141.                      | +                                        | +          | +          | —         | —    | —     | +    | —        | 800                      | 24000    | +                                      |
| 162.                      | +                                        | —          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 400                      | 12000    | +                                      |
| 127.                      | +                                        | —          | —          | +         | +    | —     | —    | —        | 800                      | 48000    | +                                      |
| 5.                        | +                                        | +          | +          | +         | —    | —     | —    | +        | 3200                     | 16000    | +                                      |
| 19.                       | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 800                      | 48000    | Koli                                   |
| 124.                      | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 1600                     | 48000    | +                                      |
| 166.                      | +                                        | +          | —          | +         | —    | —     | +    | —        | 1600                     | 96000    | —                                      |
| 189.                      | +                                        | —          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 800                      | 96000    | +                                      |
| 35.                       | +                                        | —          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 800                      | 96000    | +                                      |
| 73.                       | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | —    | —        | 800                      | 96000    | +                                      |
| 170.                      | +                                        | —          | —          | +         | —    | +     | —    | —        | 1600                     | 12800    | +                                      |
| 68.                       | +                                        | +          | +          | —         | —    | +     | +    | —        | 400                      | 1600     | +                                      |
| 163.                      | +                                        | —          | —          | +         | —    | —     | —    | —        | 800                      | 6400     | +                                      |
| 193.                      | +                                        | +          | —          | —         | —    | —     | +    | —        | 200                      | 3200     | +                                      |
| 23.                       | +                                        | —          | +          | +         | +    | —     | —    | —        | 3200                     | 48000    | +                                      |

b) der sauber gehaltenen Versuchshühner

| Nr.<br>des<br>Huh-<br>nes | Veränderungen wurden<br>festgestellt an: |            |            |          |      |       |      |          | Agglutinations=<br>titer |          | Bact.<br>pullorum<br>nach-<br>gewiesen |
|---------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------|------|-------|------|----------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
|                           | Eierstock                                | Herzmuskel | Herzbeutel | Buchfell | Darm | Leber | Milz | Eileiter | niedrigster              | höchster |                                        |
|                           |                                          |            |            |          |      |       |      |          |                          |          |                                        |
| 149.                      | +                                        | +          | +          | +        | +    | —     | —    | —        | 200                      | 25600    | +                                      |
| 104.                      | +                                        | +          | +          | +        | +    | —     | +    | —        | 400                      | 6400     | +                                      |
| 63.                       | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | —    | —        | 400                      | 6400     | +                                      |
| 152.                      | +                                        | +          | +          | +        | —    | —     | —    | —        | 800                      | 3200     | +                                      |
| 17.                       | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | —    | —        | 800                      | 12000    | +                                      |
| 81.                       | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | +    | —        | 400                      | 25600    | +                                      |
| 101.                      | +                                        | +          | +          | —        | —    | —     | +    | —        | 400                      | 24000    | +                                      |
| 144.                      | +                                        | +          | +          | —        | —    | —     | +    | —        | 400                      | 6400     | +                                      |
| 27.                       | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | —    | —        | 800                      | 24000    | +                                      |
| 51.                       | +                                        | +          | +          | —        | —    | —     | —    | —        | 400                      | 12800    | +                                      |
| 78.                       | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | +    | —        | 3200                     | 24000    | +                                      |
| 128.                      | —                                        | +          | —          | —        | —    | —     | +    | —        | 400                      | 12000    | —                                      |
| 174.                      | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | +    | —        | 800                      | 24000    | +                                      |
| 112.                      | +                                        | +          | +          | —        | —    | —     | —    | —        | 800                      | 25600    | nicht angel.                           |
| 142.                      | +                                        | +          | +          | —        | —    | +     | —    | —        | 1600                     | 24000    | +                                      |
| 24.                       | —                                        | +          | —          | —        | —    | —     | —    | —        | 400                      | 48000    | —                                      |
| 15.                       | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | +    | —        | 1600                     | 96000    | +                                      |
| 52.                       | +                                        | +          | +          | —        | —    | —     | —    | —        | 400                      | 6400     | +                                      |
| 164.                      | +                                        | —          | —          | +        | +    | +     | —    | +        | 3200                     | 48000    | +                                      |
| 191.                      | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | —    | —        | 6400                     |          | +                                      |
| 43.                       | +                                        | —          | —          | —        | —    | +     | —    | —        | 3200                     |          | + (Leber)                              |
| 76.                       | +                                        | +          | —          | —        | —    | —     | —    | —        | 3200                     |          | +                                      |
| 193.                      | +                                        | —          | —          | —        | —    | —     | —    | +        | 400                      |          | —                                      |

Am Schlusse meiner Arbeit habe ich die angenehme Pflicht, meinem verehrten Chef, Herrn Direktor Dr. Eickmann, für die Anregungen meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Desgleichen sei es mir gestattet, Herrn Dr. Thur für das Interesse, das er meiner Arbeit, insbesondere in Fragen der Technik, entgegenbrachte, sowie der technischen Assistentin Fräulein Specht, die mir bei der Durchführung der umfangreichen Agglutinationen mit großem Verständnis zur Hand ging, aufrichtig zu danken.

---

## Literatur.

1. Altemeier, H. (1928): Das Vorkommen von *B. pullorum* in Bruteiern. Vet.-Diff. Hannover 1928.
2. Beach, J. R. (1929): Concerning methods of testing fowls for bacillary white diarrhea. N. amer. Veterinarian **10**. 54.
3. Beaudette, F. R.: Single Tube Method for Determining Carriers of *Bacterium Pullorum*. Amer. vet. med. Assoc. **64**. 225.
4. Beaudette, F. R., Bushnell, L. D., Payne, E. S. F. (1923) Relation of *Bact. pull.* to hatchability of eggs. Journ. infect. diseases. **33**. 331.
5. Beck u. Eber, R. (1927): Bakterielle weiße Ruhr der Küken Arch. Tierheilk. **56**. 121.
6. Bederke, O. (1928): Amerikanische Studien auf dem Gebiete der bazillären weißen Ruhr der Küken und über den Wert der Agglutinationsprobe. Festschr. Eugen Fröhner z. s. 70. Geburtstag. S. 26.
7. Beller, K. (1926): Bakterielle Kükenruhr (logen. weiße Ruhr) und ihre Beziehungen zum Hühnertyphus. Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamt. **57**. 462.
8. Ders. (1927): Zur Aetiologie des Kükensterbens. Deutsch. tierärztl. Wschr. **35**. 827.
9. Ders. (1927): Kükenaufzucht und Kükenkrankheiten. Münch. tierärztl. Wschr. **78**. 461.
10. Ders. (1928): Das Auftreten und die Bedeutung der Kükenruhr in Deutschland, nebst Vorschlägen zu ihrer Bekämpfung. Berl. tierärztl. Wochenschr. **44**. 33.
11. Ders. (1930): Weiße Kükenruhr und Hühnertyphus. Berl. tierärztl. Wschr. **46**. 884.
12. Beller, K. und Latif, A. (1929): Bakterielle Kükenruhr (logen. weiße Ruhr) und ihre Beziehungen zur hämorrhagischen Septikämie. Arch. Tierheilk. **60**. 40.
13. Bittner, H. (1927): Die Anatomie der zur Blutentnahme geeigneten Stellen beim Hausgeflügel. Berl. tierärztl. Wschr. **43**. 568.
14. Brunett, E. L. (1928): Transmission of *Bact. pull.* infection among mature chickens. Cornell veterinarian **18**. 135.
15. Bunyea, H. (1927): An enzootic salpingitis of pullets with special reference to *Salmonella pullora* infection. J. amer. vet. med. Assoc. **70**. 545.
16. Bunyea, H. and Hall, W. J. (1929): Some observations on the pathology of bacillary white diarrhea in baby chicks. J. amer. vet. med. Assoc. **75**. 581.

17. Bunyea, H., Hall, W. J. and Dorset, M. (1929): A simplified agglutination test for pullorum disease. J. amer. vet. med. Assoc. **75**. 408.
18. Bushnell, L. D. and Brandly (1929): Some experiments on the control of bacillary white diarrhea. J. amer. vet. med. Assoc. **74**. 444.
19. Coon, Chas. J. (1928): Some experiments in desinfecting incubators with formaldehyde. J. amer. vet. med. Assoc. **72**. 627.
20. Craig, R. A. (1927): The control of bacillary white diarrhea. J. amer. vet. med. Assoc. **70**. 916.
21. Dalling, T. H. and Allen, H. R. (1924): Bacillary white diarrhea of chicks. Vet. Journ. **80**. 442.
22. Dalling, T. H., Mason, J. H. and Gordon, W. S. (1927): Bacillary white diarrhea of chicks (B.W.D.) Vet. Journ. **83**. 555.
23. Diefelben (1927): Bacillary white diarrhea: Results of testing and breeding flock. Vet. record. **7**. 101.
24. Doyle, T. M. (1926): Bacillary white diarrhea of chicks. Journ. of the ministry of agricult. **33**. 517. (Ref. Jber. Vet. med. 1926. S. 1436).
25. Ders. (1927): Observation of B. pullorum infection of cock birds. Vet. Journ. **83**. 305.
26. Eber, R. (1928): Ein Fall von Hühnertyphus bei jungen Enten. Deutsh. tierärztl. Wfchr. **36**. 121.
27. Edwards, Ph. R. and Hull, F. E. (1927): A comparison of the agglutination test and the intradermal test in the detection of bacillary white diarrhea. J. amer. vet. med. Assoc. **71**. 590.
28. Diefelben (1928): The accuracy of the agglutination test in the diagnosis of bacillary white diarrhea. J. amer. vet. med. Assoc. **73**. 839.
29. Diefelben (1929): The transmission of bacillary white diarrhea among hens. J. amer. vet. med. Assoc. **75**. 333.
30. Diefelben (1929): The constancy of the agglutination test in the detection of bacillary white diarrhea. J. amer. vet. med. Assoc. **75**. 765.
31. Fitch, C. P. and Lubbehusen, R. E. (1928): The agglutination test as applied in the control of bacillary white diarrhea. Corn. veterin. **18**. 19. (Ref. Jber. Vet. med. 1928. S. 1315.)
32. Gadeberg, R. (1929): Untersuchungen über die Morphologie des Bakteriums pullorum. Prag. Arch. Tiermed. **9**. 106 u. 148.
33. Gage, G. E. (1923): Concerning the diagnosis of Bacterium pullorum infection in the domestic fowl. Massachus. Sta. Techn. Bull. 5. (Ref. Jber. Vet. med. **43**. S. 295).
34. Goldberg, S. A. (1917): A study of the fermenting properties of Bact. pull. and Bact. sanguinarium. J. amer. vet. med. Assoc. **50**. 203.
35. Graham, R. and Tunnicliff, E. A. (1927): Studies in the diagnosis of bacillary white diarrhea. J. amer. vet. med. Assoc. **70**. 612.
36. Gressel. (1927): Vergleichende Untersuchungen über das Bakt. paratyphosiae (Bac. gallinarum Klein, Bact. sanguinarium Moore, Bac. typhi gallinarum alcalifaciens Pfeiler). Deutsh. tierärztl. Wfchr. **35**. 267.

37. Derfelbe (1928): Zur Differenzierung des *Bact. pullorum* (Rettger) vom *Bact. paratyphosae* (*Bact. gallinarum* Klein, *Bact. sanguinarium* Moore, *Bact. typhi gallinarum alcalifaciens* Pfeiler). Deutsche tierärztl. Wchr. **36**. 291.
38. van Heelsbergen, T. (1929): Handbuch der Geflügelkrankheiten und der Geflügelzucht. Verlag: Enke, Stuttgart.
39. Heim, L. (1918): Lehrbuch der Bakteriologie. 5. Aufl. S. 22. Verlag: Enke, Stuttgart.
40. Hewitt, E. A. (1928): Bacillary white diarrhea in baby turkeys. Corn. Veterin. **18**. 272. (Ref. Jber. Vet. med. 1928. S. 1315.)
41. Hinshaw, W. R. (1929): Eradication of pullorum disease. Veterin. med. **24**. 390.
42. Derfelbe (1929): Standardization of bacillary white diarrhea control methods in New-England. J. amer. vet. med. Assoc. **74**. 434.
43. Hinshaw, W. R., Beach, J. R., Butler, W. J., Goldhaft, A. D. Goss, L. W., Graham, R. and Stubbs, E. L. (1929): Report of committee on poultry disease. J. amer. vet. med. Assoc. **75**. 464.
44. Hinshaw, W. R. and Sanders, E. F. (1928): Bacillary white diarrhea. Veterin. med. **23**. 219.
45. Hinshaw, W. R., Scott, H. M. and Payne L. F. (1928): Further studies on dissemination of salmonella pullorum infection in incubators. J. amer. vet. med. Assoc. **72**. 599.
46. Hinshaw, W. R., Upp, C. W. and Moore, J. W. (1926): Studies in transmission of bacillary white diarrhea in incubators. J. amer. vet. med. Assoc. **68**. 631.
47. Hof, J. (1928): Das Vorkommen des *Bazillus gallinarum* Klein in der Kloake von Hühnern. Vet.-Diff. 1928.
48. Jarmai, (1928): Todesfälle bei erwachsenen Hühnern infolge von Infektion mit *Bakt. pull.* Deutsch. tierärztl. Wchr. **38**. 112.
49. Jones, F. L. (1910): Fatal septikaemia of bacillary white diarrhea in young chickens. New York State Vet. Col. Rep. 1910, S. 111.
50. Derfelbe (1912): An outbreak of an acute disease in adult fowls due to *Bacterium pullorum*. Journ. med. research. **24**. 471.
51. Derfelbe (1913): The value of macroscopic agglutination test in detecting fowls that are harboring *Bacterium pullorum*. Journ. med. research. **27**. 481.
52. Kernkamp, H. C. H. (1929): The results of repeated testing by the agglutination method for the detection of bacillary white diarrhea in adult chickens. Corn. Veterin. **19**. 357.
53. Klimmer, M. und Haupt, H. (1927): Ein Beitrag zur Ätiologie und Bekämpfung der Gallinarumbazillose der Küken. Berl. tierärztl. Wchr. **43**. 681.
54. Konno, T. (1925): Bacillary white diarrhea of young chicks in Japan. Journ. Japan soc. vet. science. **4**. 287.
55. Knight, E. (1925): Blood agglutination tests on adult fowls

- in respect of „bacillary white diarrhea“ or infectious septikaemia of young chicks. Journ. Path. Bact. **27**. 231.
56. Lahaye, J. (1929): Quelques mois de clinique aviaire. Ann. Méd. vét. **74**. 337.
  57. Lerche. (1928): Beobachtungen über die bakterielle Kükenruhr in Schlefien. Deutsche tierärztl. Wfchr. **36**. 708.
  58. Derfelbe (1929): Die bakterielle weiße Ruhr der Küken. Zeitschrift Infkr. Haust. **35**. 139.
  59. Derfelbe (1930): Versuche ü. Kükenruhr. Tierärztl. Rdsh. **36**. 332.
  60. Lesbougries, Rinjard et Gasse (1929): Prophylaxie de la diarrhée blanche due à B. pull. Bull. Acad. vét. France **2**. 175.
  61. Lewis, H. R. (1920): Control of bacillary white diarrhea. New Jersey Stat. Rep. 1920. (Ref. Jber. Vet. med. Jg. 1923. 293.)
  62. Leynen. (1927): La diarrhée blanche bazillaire en Belgique. Ann. méd. vét. **72**. 193.
  63. Lüttschwager (1929): Die bakterielle weiße Kükenruhr u. ihre Beziehungen zu typhösen Hühnererkrankungen. Arch. Geflkd. **3**. 226.
  64. Magnusson, H. (1928): Om hönstypus och vit diarre hos kyckling. Skand. Vet.-Tidskr. **18**. 137. (Ref. Jber. Vet. med. Jg. 1928. S. 1317).
  65. Mallmann, W. L. (1927): An improved antigen for the agglutination test in bacillary white diarrhea. J. amer. vet. med. Assoc. **71**. 600.
  66. Mathews, F. P. (1927): Factors influencing the control of bacillary white diarrhea. Veterin. record. **7**. 837.
  67. Derfelbe. (1927): Factors influencing the control of bacillary white diarrhea. J. amer. vet. med. Assoc. **71**. 585.
  68. Manninger, R. (1921): Bakterielle weiße Ruhr der Küken (Ungar) Allatorv. Lapok. 1921. S. 111. (Ref. Deutsch. tierärztl.-Wfchr. **30**. 657.)
  69. Derfelbe. (1927): Untersuchungen über Kükenruhr und Hühner-typhus. Zeitschr. f. Inf. Krankh. **32**. 265.
  70. Michels, H. (1928): Untersuchungen über die Kükenruhr. Vet.-Diff. 1928. Hannover.
  71. Mießner, H. (1927): Die Bekämpfung der weißen Ruhr der Küken. Arch. f. Geflkd. **1**. 239.
  72. Derfelbe. (1930): Die Pulloruminfektion des Huhnes. Deutsch. tierärztl. Wfchr. **38**. 517.
  73. Mießner, H. und Berge, R. (1928): Die weiße Ruhr der Küken (B. pull.). Deutsch. tierärztl. Wfchr. Jubiläumsheft. S. 44.
  74. Dieselben (1930): Schnellagglutinationsmethoden zur Erkennung der Pulloruminfektion b. Huhn. Deutsch. tierärztl. Wfchr. **38**. 401.
  75. Newsom, J. E., Cross, F. and Ufford, O. C. (1928): On the accuracy of the agglutination test for bacterium pullorum infection as shown by repeated tests on the same birds. J. amer. vet. med. Assoc. **72**. 611.

76. Niemann, K. W. (1929): Bacillary white diarrhea. Distribution of lesions in 1008 chicks. New amer. Veterinarian **10**. 51.
77. Derfelbe (1929): Pennsylvania method for the prevention, control and eradication of Salmonella pullora infection (bacillary white diarrhea). New amer. Veterinarian **10**. 53.
78. Nystedt, H. (1929): Den serologiska reaktionens värde för diagnosis av sjukdomen vit diarré hos kyckling. Skand. Vet.-tidskr. **19**. 81. (Ref. Jber. Vet. med. 1929. S. 1309).
79. Olney, J. F. and Bederke, O. (1928): Bacillary white diarrhea and the agglutination test. J. amer. vet. med. Assoc. **73**. 350.
80. Owen, J. A. (1928): An experience with bacillary white diarrhea. N. amer. Veterinarian **9**. 42.
81. Rettger, L. F. (1900): Septikaemia among young chickens. New York med. Journ. **71**. 803.
82. Derfelbe (1901): Fatal septikaemia among young chickens. Ebenda **73**. 267.
83. Derfelbe (1914). Ovarian infection in the domestic fowl and direct transmission of disease to the offspring. Journ. exp. medic. **19**. 552.
84. Derfelbe (1929): The need of accepted scientific standards and rigid adherence to them, in pullorum disease control. J. amer. vet. med. Assoc. **74**. 453.
85. Rettger, L. F. and Stoneburn, F. H. (1910): Bacillary white diarrhea of young chicks. Connecticut Storrs Station, Bulletin 60. 33. Ref. Exper. Stat. Res. **22**. 489.
86. Rettger, L. F. and Koser, St. A. (1917): A comparative Study of B. pull. and B. sang. Journ. med. research **35**. 443.
87. Rice, J. P. (1927): Poultry diseases, an urgent veterinary problem. Veterin. record **7**. 33.
88. Derfelbe (1928): Poultry diseases. Vet.-Journ. **84**. 446.
89. Riedmüller, L. und Weidlich, N. (1928): Über das Auftreten der weißen Ruhr der Küken. Schw. Arch. Tierhk. **70**. 544.
90. Rohonyi, N. (1928): Über die weiße Ruhr des Geflügels. Ref. Tierärztl. Rdch. **34**. 163.
91. Runnels, R. A., Coon, C. J., Farley, H. and Thorp, F. (1927) An application of the rapid method agglutination test to the diagnosis of bacillary white diarrhea infection. J. amer. vet. med. Assoc. **70**. 660.
92. Schmidt-Hoensdorf, F. (1926): Neuere Untersuchungen bei Junggeflügelkrankheiten. Berl. tierärztl. Wchr. **42**. 859.
93. Derfelbe (1928) Die bakterielle Kükenruhr und ihre Bekämpfung. II. Mitteilung. Serodiagnostik. Arch. Tierhkd. **57**. 472.
94. Derfelbe (1929). Die bakterielle Kükenruhr und ihre Bekämpfung III. Mitteilung. Kükenruhr bei erwachsenen Hühnern. Arch. Tierhkd. **59**. 593.
95. Spiegl, A. und Schmidt-Hoensdorf (1927): Die

- bakterielle Kükenruhr und ihre Bekämpfung. I. Mitteilg. Arch. Tierhkd. **56**. 313.
96. Stafseth, H. J. and Thorp jr., F. (1928): Studies of the agglutination and pullorin tests for bacillary white diarrhea as to the efficiency of each in detecting carriers of *Salmonella pullorum* infection. J. amer. vet. med. Assoc. **72**. 745.
97. Steenblock, J. [1930]: Beitrag zur Methodik der Frischblut Schnellagglutination auf Pulloruminfektion unter Verwendung eines neuen Agglutinationstisches. Tierärztl. Rdsch. **36**. 881.
98. Wagener, K. [1929]: Maßnahmen zur Bekämpfung der weißen Kükenruhr. Berl. tierärztl. Wschr. **44**. 420.
99. Derfelbe (1930): Stand, Ziel und Wege der Kükenruhrbekämpfung in Deutschland. Arch. Geflkd. **4**. 244.
100. Derfelbe (1930): Neue Methodik der Blutuntersuchung auf Kükenruhr für Laboratorium und Praxis. Tierärztl. Rdsch. **36**. 477.
101. Wernery, H. [1928]: Die Ruhr der Küken und ihre Bekämpfung; eine literarische Studie. Preisaufgabe der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. 1927/28.
102. Wiemann, J. und Franke, G. [1928]: Der deutsche Viehbestand u. die Tierseuchen in Zahlen, Karten und Tafeln [Berlin].
103. Wilson, J. D. [1929]: The result of three year's work in white diarrhea infection control in Virginia. J. amer. vet. med. Assoc. **74**. 439.
104. Sokolowsky, A. [1928]: Zur Bekämpfung der „Weißen Ruhr“ der Küken. Deutsch. tierärztl. Wschr. **36**. 23.
105. Verhandlungsbericht über die 14. ordentliche Dienstversammlung der Leiter der Bakteriologischen Institute der Landwirtschaftskammern am 27. und 28. Mai 1930 im Sitzungssaal der Landwirtschaftskammer für die Provinz Westfalen in Münster. Deutsch. tierärztl. Wschr. **38**. 658.
-

## Lebenslauf.

Als Sohn des Landwirts Bajo Steenblock wurde ich am 22. März 1904 in Digum, Kreis Weener (Ostfriesland) geboren. Ich bin evangelisch-reformierter Konfession.

Von 1910 bis 1917 besuchte ich die einklassige Volksschule in Pogum. Dann absolvierte ich von Ostern 1917 bis Ostern 1922 die Realschule in Emden. Anschließend besuchte ich drei Jahre die Oberrealschule in Oldenburg (Oldb.), wo ich Ostern 1925 das Zeugnis der Reife erlangte. Vom Sommersemester 1925 bis zum Ende des Sommersemesters 1929 studierte ich an der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover. Nach dem vierten Semester bestand ich das veterinärmedizinische Vorexamen. Während meines Studiums habe ich mich sehr an der Sportbewegung der Hochschule beteiligt und war von 1928 bis 1930 Leiter des Amtes für Leibesübungen. Am 8. März 1930 erlangte ich die Approbation als Tierarzt. Seit dem 1. April 1930 bin ich als Assistent am Bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz in Bonn tätig.

Jan Janßen Steenblock.  
Tierarzt.